

S Y N O P S I S  
*NOSOLOGIÆ METHODICÆ,*

EXHIBENS

CLARISS. VIRORUM

*S. IUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET  
MACBRIDII,*

SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.  
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,  
ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;  
NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. REG. EDINE,  
PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.  
MED. HAUNIENS. ET REG. MED. EDINB.  
SODALIS.

EDITIO QUARTA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

T O M. I.

E D I N B U R G I:

Prostant venales apud GULIELMUM CREECH; et J.  
MURRAY, No. 32, FLEET STREET, LONDON.

---

M,DCC,LXXXV.

PARS SEXTA  
G E N E R A  
M O R B O R U M

P R Æ C I P U A

D E F I N I T A,

A D D I T I S S P E C I E B U S

C U M H A R U M E X S A U V A G E S I O S Y N O N Y M I S,

A

G U L I E L M O C U L L E N,

Edinburgi 1785.

# LECTORI

S.


**P**RODIT jam quarta vice, multum, ni  
nos fallunt amici, expetita Synopsis  
haec nosologiae methodicae. Quam, ut  
expectationi eruditorum pro virili satisfacere-  
rem, plurimum auctam, ubique emenda-  
tam, et usibus, ut spero, medicorum ac-  
commodatiorem, exhibui.

UT omnia fere, ad rem nosologicam  
spectantia jam edita, sub uno conspectu  
hic ponerem, ex systemate symptomatico  
Clar. MICH. SAGARI, Anno 1776 Viennae  
edito, quae ad genera morborum definienda  
pertinent excerpta, hic iterum dedi; et si-  
mul, quae ex scriptis egregii viri Davidis  
Macbride ad eandem finem conferre pos-  
sent, hic primum addidi.

QUÆ

Quæ porro in re nosologica ipse conatus sum, emendatoria, et plurimum aucta, hic protuli; quæ tamen de his ulterius hic dicenda essent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius præfixis, inveniri possunt; atque illuc Lectorem ablegamus.





## PROLEGOMENA.

**R**ES est inter medicos fatis nota, morbos quosdam natura five causa proxima diversos, externa tamen facie, five symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

Dum medici vero, in ipso artis usu verfati, de morbis distinguendis saepe incerti sint, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quae hanc ambiguitatem solvere valeant. Saepe quidem observatum est, descriptiones, five historias,

A

quas

quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancas et imperfectas esse; et nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres Graecos et Romanos, in observandis et notandis morborum phaenomenis, diligentes et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quae nobis utiles esse possint exstare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re aestimationem nimiam conciliaffe. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quaedam quae morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quae autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus aestimata, parum profecto nos docuissent,

docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum autoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum plerasque, quae in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversae pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

NEC nisi sero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces,  
in

in instauranda veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

Nec ejusdem aevi medici chemici, Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertebant.

HINC quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullae fere morborum historiae plenae vel accuratae conscriptae sint. SYDENHAMUS vero, sagacitate et judicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phaenomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem  
et

et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

Ad hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius reddendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis haec vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, praeconceptis occaecati, non percipiebant, vel etiam fictis

et

et falsis corrumpebant. Plures, re omni quovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem praeter modum amplificaverunt. Plures denique, ut observationibus, hodie adeo expetitis, famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Haec omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta haëtenus morborum historia satis clare constaret; sed haec omnia impraesentiarum praetermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimaë etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujusvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia

ventitia et fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quae ad distinctionem cuiusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorem reddiderunt.

De hacce in historiis morborum redundantia saepe conquetti medicinam facientes, pathognomonica quae dicuntur desiderarunt; hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quae cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico et certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomonica in scriptis medicis nondum data, neque unicuique morbo assignata sunt; nec quantum video nisi per Nosologiam methodicam, rite institutam, assignari queunt.

DUDUM quidem SYDENHAMUS et solers BAGLIVIVS, quo facilius et certius morbi  
distingue-

distingerentur, morbos omnes, per normam methodi botanicae, ad genera et species, appositis characteribus idoneis, referri voluerunt : Id est, ut institueretur Nosologia methodica. Hoc etiam consilium alii summae famae medici comprobarunt, et quisque, ni fallor, in artis usu occupatus factum fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi protinus tentatum fuit ; an quidem ex fructu inde capiendo parum perspecto, an vero ex difficultate operis praevisâ, non constat ; sed revera nihil omnino tentatum fuit, donec celeberrimus FRANCISCUS BOISSIER DE SAUVAGES, circa annum 1732, rem aggressus sit.

Quæ quidem, exeunte seculo decimo sexto, FELIX PLATERUS in morbis secundum symptomata ordinandis conatus est quodammodo huc referri possunt ; conatus autem isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut quenquam eosdem profecuturum esse vix expectandum fuit ; et revera ante SAUVAGESIUM



SIUM nemo, quantum novimus, ulla ex parte profecutus est. Haud dissimulandum quidem, PLATERUM SAUVAGESIO quaedam fugcessisse; pauca tamen, nec fausta admodum, et quae nemini usui fuissent, nisi SAUVAGESIUS, cum meliore spe, opus multo longius provexisset.

IPSE quidem SAUVAGESIUS primum lente et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non nisi post multam lectionem, et assiduam per triginta annos meditationem, Nosologiam methodicam suam, anno 1762 editam, protulit.

INTEREA, duo alia, in Nosologia methodica, tentamina facta sunt; alterum a celeberrimo viro, et in distributione rerum methodica plurimum exercitato, CAROLO A LINNE; alterum ab erudito Professore Gottingensi, RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL. A neutro tamen, utpote vestigiis SAUVAGESII presse nimis insistente, opus multum promotum fuisse videtur.

B

CUM

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinae praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiae methodicae studium allicere; et, quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere SAUVAGESII, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quae ad genera et species morborum distinguendas pertinerent excerpti, et cum his LINNÆI et VOGELII libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

DIFFICILE

DIFFICILE quidem erit, hanc rem protinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promovere arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc, etsi nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

QUI ante nos huic studio operam dederunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species parum perspectas habentes, ad suprema classium et ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero, species solum datae sunt; et generum constitutio est mentis humanae excogitatio, quae, donec species omnes bene notae et perspectae fuerint, fallax et incerta erit; et in generibus quidem constituendis, nisi ad species semper

per respiciamus, labor noster vanus et futilis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neutiquam adhuc absoluta est. Classēs enim vel etiam ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutae sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

Cum res distinguendae, numero quam plurimae sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quaedam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosae sint, et quarum sigillatim recensitarum reminisci, memoriae in plerisque hominibus vires non excedat, eas, summa sollicitudine, ad classes et ordines referre vix opus esse videtur.

ITA

ITA Illustris DE BUFFON. quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quae in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad majorem accurationem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quae ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad pleniorum et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Etsi enim ejusmodi institutionem,

tutionem, ubique certam et accuratam semper assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, saepe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per symptomata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quaecunque in rerum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et hujusmodi distinctio generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituendis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei praecipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex hujus studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem judicaverint.

Qui

QUI impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Haec autem indicia nulla alia esse possunt, quam quae morbum quemque per genus et speciem definiant, quae rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hactenus saepe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius

curatius considerandas, vel ad observationes postea diligentius faciendas, ducent; quin et plurimum valebunt, tum ad Nosologiam methodicam, tum ad distinctionem morborum, tandem perfectiorem reddendam.

QUAMVIS morborum characteres hactenus propositi saepe erronei, saepe deficientes sunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in tertia Synopsis editione ex systemate symptomatico CL. MICHAELIS SAGAR, quae ad genera morborum definienda pertineant, excerpti, et in hac quarta editione, Ingeniosi Davidis Macbride, Tabulas Nosologicas addidi, et caeteris supra memoratis subjunxi. Haec autem tentamina omnia simul edita sunt, ut juxta posita facilius conferri possint, et ut collata vel optimos et maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, et ad distinctiones magis exactas obtinendas, lectores ducant.

HUJUSMODI



HUJUSMODI studium plurimis medicis necessarium fore facile credo ; nam morborum titulis inhaerentes, notiones parum accuratas et determinatas habent ; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiae methodicae studio, duci vix possunt.

Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiae Methodicae manifestam fore spero ; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA et praecipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis aegris praesentes detegerentur et dignoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definiri possint ; et cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus praesertim distinguendis,

dis, impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus; et ad eas dignoscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.

IN generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui; quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo; cum enim discipuli nostri genera facile et satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

GENERA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt; et hujus rationes postea locis idoneis tradendae venient. In-  
terea

terea notandum, plura genera, quae primo intuitu omiffa videantur, nequaquam ex oculis studiosorum sublata effe, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti fynonyma recenseantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica et primaria notanda effe duximus; dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, five symptomata nusquam per se existentia; et neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Auxic-tas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, et *Ar-dor*, a SAUVAGESIO, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

DENIQUE, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus VITIORUM  
et

et DEFORMITATUM, plura a nobis omit-  
tuntur; vel quod morbi adeo leves sint, ut  
medicorum attentionem et curam non me-  
reantur; vel quod congeniti et immutabi-  
les medicorum artem penitus eludant. Ita  
*Lentigo, Leuce, Cyasma, Seline, et Cicatrix,*  
ex classe VITIORUM; et *Phoxos, Gibber,*  
*Rhyssmata, Canities, Coloboma, Naevus,*  
*Monstrositas, Rhicnosis, Varus, Valgus, Leio-*  
*pedes, Saniodes, Cripforchis, Hermaphroditus,*  
*Dionysiscus, Galiancon, Galbulus,* et alia ex  
classe DEFORMITATUM apud VOGELIUM  
recensita, recte a nobis omissa putamus.  
Ejusmodi vitia et deformitates, fortassis in  
pathologia, sive historia generali, mutatio-  
num quas, quavis occasione, subit corpus  
humanum notari possent; Nosologiam au-  
tem methodicam iis adeo frivolis onerare,  
vel eandem tam multis novis et inutilibus  
appellationibus turbare, minime idoneum  
videtur. Judicet itaque lector, quam me-  
rito gloriatur Cl. SAGAR, se generum nu-  
merum auxisse.

QUOD,

Quod, modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omisso non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omissiones agnosco, et quidem doleo; sed variae rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo, fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; dein, sunt alii satis noti, quibus, in nostro systemate, locus idoneus nusquam inventus est; denique, sunt alii quorum historia apud medicos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omitterentur, ad calcem operis, omnium, quotquot noverim, catalogum subjunxi, ut posterius perspicaciores, ea diligentius perpendentes, characteres et locum iis assignent.

Eodem consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda praeter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum redegi.

redeggi. Hoc magis periculosum videri potest, cum nullam speciem, quae revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensionem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timidum antehac diu cohibuit; et id tantum tentare ausus sum, ut species, a SAUVAGESIO recensitas, serie paulo luculentiore et emendatiore traderem: Re autem amplius, et curatius perpensa, species jam recensurus, numerum eorum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nam SAGARUM nihil moror, in recensione specierum quicquid praestitit; et licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re medica meritus sit; haud tamen dissimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa appellatione repetitas, pro diversis ponebat; et praesertim dum species sympathicas, tam saepe idiopathicis immiscebat, qua ratione earum numerum totum

tum praeter modum auxit. Hos ut tollem errores, quod potui feci, numerosis nempe apud SAUVAGESIUM speciebus, recte, quantum ego judico, ad pauciores redactis.

QUOD ut efficerem, primo species plures, ut diversas a SAUVAGESIO recensitas, pro una eademque habui, et sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis suis idoneis posthac tradendae sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum pro veris et genuinis enumerare velim, quotquot pro symptomaticis habere potui, totidem ex numero specierum apud SAUVAGESIUM sustuli. Cum autem, in recensione specierum symptomaticarum aliquis usus sit, earum recensitionem, seorsum tamen, denuo apposui.

DENIQUE, alia et praecipua ratio, qua specierum, a SAUVAGESIO recensitarum, numerum minuendum esse censui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas, pro specierum

specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimirum, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quae in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilius erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhiberi ubique annisum sum; quod si non in omnibus, cum aequae certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quae sequuntur pensitatis, saepe fecisse videor.

Cum morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica



raëteristica omnia et solo, in unoquoque ostendit; quantumvis haec in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; et, in universum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates praebere censemus.

TUNC igitur de varietate a specie distinguenda quaestioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cujusvis speciei symptomatis, quaedam absint, vel iisdem quaedam addita sint.

CUM ex symptomatis solitis quaedam absint, quoties inter symptomata, quae magis, et ea quae minus, essentialia sunt distinguere liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus.

CUM vero symptomatis characteristicis alia quaedam addita sint, si addita pro symptomatis symptomatum, potius quam pro

D                      symptomatis

symptomatis causae haberi queant, varietatem tantum constituunt.

DENUO, cum symptomata addita, in specie data, prorsus insolita sint, et simul conditiones morbi praecipuas parum vel nihil mutari videantur, haec quoque varietatem tantum praebere censenda.

CUM morbi genus quoddam, ex principiis diversis oriri queat, idem, ex diversitate principii, specie diversum evadere potest, nec semper tamen; nam, quotiescunque diversitas illa parva fuerit, et simul symptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non nisi varietatem exhibere, putamus.

MORBI genus itidem, pro diversa ejus sede, diversae speciei fieri potest; quotiescunque vero sedes diversa, neque partis structurae, neque functionis ratione differat, hujusmodi sedis diversitas etiam pro varietate tantum habenda est.

PORRO,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quae ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

ALTERA est, quod principii quaedam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriantur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimae naturae esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata,  
oriri

oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint, eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc praesertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversae, tribui possunt.

MORBOS, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimae naturae esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicam ejusdem generis speciem, praebere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

HÆC

HÆC omnia, non solum de exanthematibus contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurium esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an fecus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul praemonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiae veritate sibi satisfacere, vel potius quas limites utrique sint ponendae, statuere.

ALTERA res, quae similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causae eorum proximae, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui  
iisdem

iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturae esse oportet.

HUJUSMODI ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad februm intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcumque in praxi medica, aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videantur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo saepe frustranea, sanationes saltem minus perfectae sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino opus

pus esse, ut remedia, non solum generi sed speciei cuique, et saepe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorē, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quascunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in Nosologia methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerasque notare et recensere. Hoc itaque praestare ubique annisus sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic opere se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

EXPOSITA jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo eorum, quae admisi, characteres constituendi sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS

IMPRIMIS igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro, ex notis quae sensibus sunt obviae, illas medici potius quam aegri sensibus percipiendas, semper praetuli; quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis praecipue seligenda putavi, quae perpetuo cum morbo praesentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succedentium, character saepe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quaestio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere liceat?

AD



Ad hanc responderi possit; quod; etiā si de principiis morborum apud medicos iudicium saepe fallax, et prorsus falsum sit; nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda; huiusmodi principia in Nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quaestio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium, nullo modo dignosci queant; ut huiusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in Nosologia usurpari debent. Ita apud Ill. LINNÆUM *Febrium*

E

continen-

*continentium*, quas vocat, characteres a diurnitate totius morbi desumpti prorsus inepti sunt.

IN constituendis morborum characteribus, regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus, ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant; nec plura tamen adhibenda sunt. Priores Nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederint, plerumque nimis breves et deficientes fuisse; et forsan mihi vitio verti potest, quod aliquando sim in iisdem nimis longus et redundans. Nusquam quidem volens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare, quippe posteris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.

IN characteribus denique morborum constituendis, quaeritur etiam, an ex defectu  
functionis

functionis cujuslibet, quae in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINNÆO sub ordine *constrictiorum*, et a VOGELIO sub classe *epischesium*, recensentur, penitus omisit.

SED, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiamsi in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et symptomata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, saepe symptomatum causam manifestam,

manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, et *Amnesiam*, *Agrypniam*, *Ischuriam*, et alia etiam tanquam genera recensens.

QUOD notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis Nosologo adhuc fuerunt vitatae.

CUM, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eodem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.

NORUNT eruditi, III. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod

quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis et definitis, magis accuratam effecit; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantae, a LINNÆO exhibitae, in Nosologia multum profutura sit. In Nosologia autem, ac in botanice, non aequè necessarium esse videtur; tum quod tam multae rerum circumstantiae, in Nosologia, ac in botanice, notandae non veniunt; tum quod symptomatologia, in quibuscunque fere Pathologiae generalis systematibus exhibita, plurimum in hac re jam praestitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas, nec adeo plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset; et, si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneae et accurate definitae usurpatae essent, ad Nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In huiusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles et dubiae adhibeantur, uti ab auctore *Observationum Clinicarum*, quae Waraviae annis 1767 et 1768 prodierunt, factum fuisse opinor.

opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

QUOD ad denominationem morborum attinet, in Classium, Ordinum, et Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quae in LINNÆI *Criticis Botanicis*, et in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab illi auctore traduntur.

QUANDO notiones novae sunt proferendae, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus; quod tamen Ill. LINNÆUM saepe, nulla urgente necessitate, fecisse, et VOCERUM appellationibus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

Uꝛ

UT clarior et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum Nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus praecipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit incertos, saepe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas Nosologiae methodicae optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.

S E R I E S

CLASSIUM et ORDINUM\*.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

- ORDO I. FEBRES.  
II. PHLEGMASIÆ.  
III. EXANTHEMATA.  
IV. HÆMORRHAGIÆ.  
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

- O. I. COMATA.  
II. ADYNAMIÆ.  
III. SPASMI.  
IV. VESANIÆ.

\* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, et SAGARUS, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, et FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneae, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciore, et in universum,

ut



## CL. III. CACHEXIÆ.

- O. I. MARCORES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. IMPETIGINES.

## CL. IV. LOCALES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- II. DYSOREXIÆ.
- III. DYSCINESIÆ.
- IV. APOCENOSES.
- V. EPISCHESES.
- VI. TUMORES.
- VII. ECTOPIÆ.
- VIII. DIALYSES.

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Haec fortasse etiam minus absoluta videri possit, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recensitos, et illos partis singularis, sive LOCALES, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posse concedimus. Sed nihil præstantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Prolegomenis, pag. xii. allatas, de perfecta classium institutione non admodum solliciti sumus.

## CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum imminutis\*.

SYNONYMA. Morbi febriles *Autorum.*

\* Quod hic, et pluribus quae sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus praecesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulae classis notae in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleraeque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum sive symptomatum concursum notare debet, et male quidem  
cum

## ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Autorum* S. Cl. II. V. Cl. I. *Sag.* Cl. XII.

Morbi febriles critici L. Cl. II.

cum veteribus VOGELIUS calorem auctum solum, et recentiores SYLVIUS et Cel. BOERHAAVIUS pulsum velocitatem solum, pro charactere pyrexiae, sive febris ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsum signis febrem adesse judicant; quod etiam plurimum symptomatum notationem, in quovis charactere necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsum velocitatem solum, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sive quavis functionum laesione. Hisce de pyrexiae charactere quaestionibus, in charactere a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum characteribus adeo felicem esse vix licet; et in characteribus plerisque, si ad species plerasque character recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.

## SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, faltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili, et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes: Paroxysmo quovis die unico tantum\*.

Intermittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.

O. II. V. Cl. I. O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII.

O. II. †.

\* Qui perpenderit quae de febribus *remittentibus*, quae videntur continuae, a *continuis*, strictius dictis distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quamobrem, tum intermittantium tum continuarum characterem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† Febrium *remittentium*, quasi a febribus *intermittentibus* exquisitis prorsus differentium, ordinem separatum instituerunt Nosologi SAUVAGESIUS,

LIN-

## 46 GENERA MORBORUM

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II. \*.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.

13.

Continuae remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni,* Exerc. II.

LINNAEUS, et SAGARUS ; minus recte tamen, si mihi judicare fas sit. *Remittentes* enim, quae dicuntur, ex eodem principio, miasmate nempe paludum, ac *intermittentes*, oriuntur, iisdem in locis, et eodem anni tempore, utraque simul epidemice grassatur ; utraque iisdem prorsus remediis sanatur ; et saepissime in eodem homine idem, qui videtur, morbus, nunc intermittens nunc remittens typum exhibet. Morbi idcirco, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi erant.

\* Magis inconsulto adhuc VOGELIUS *remittentes* omnes cum *continuis* sociavit. *Continuae*, quas vocamus, omnes quidem remissiones et exacerbationes ostendunt ; sed a *remittentibus* ad *intermittentes* merito referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox dicetur.

## GENUS. I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta  
oſto circiter horarum: Acceſſionibus  
meridianis.

*Tertiana Auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Sag.* p.  
704. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stabl.* de tertiana  
febris genium univerſum manifeſtante, Halae 1706.  
*Ejuſd.* Caſual. magn. Caſ. 21. Caſual. min. Caſ. 96.  
*Cleghorn's diſeaſes of Minorca*, cap. III. *Senac*, de re-  
cond. febr. natura. Edinb. Med. Eſſ. vol. iv. art. 24.

TERTIANA eſt vel

I. Interpoſita apyrexia, quae

1. Variat paroxyfmi duratione.

A. Tertiana paroxyfmiſ haud ultra horas  
duodecim extenſis.

*Tertiana legitima*, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II.  
cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

*Tertiana vera*, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyfmiſ ultra horas duode-  
cim extenſis.

## 48 GENERA MORBORUM

Tertiana notha five spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr.  
L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140. *Hoffm.* Tom. II.  
p. 12.

2. Variat paroxysmorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis  
inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II.  
c. 21. V. G. 12. *Clegh.* Min. p. 141.  
Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, pa-  
roxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones,* de febr. interm.  
P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis  
altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Se-  
mitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen.* *Spig.* de femiter-  
tiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus, notabili.

Hemitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana; *Clegh.* Minorc. p. 143. \*.

Semitertiana secundi ordinis, *Galen.* *Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo hemitritæus, S. sp. 9. \*.

3. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Werlhof.* de febris, et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pif.* obs. 175. 176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

\* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.



## 50 GENERA MORBORUM

Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet. Polyalth. Vol. I.*  
p. 250.

Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelli A. N. C. Dec.*  
I. A. II. obs. 193.

Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. *A. N. C. Dec. I.*  
Ann. II. obs. 193.

Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae Trib. med.*  
p. 225. *Lautter. Hist. med. bienn. Cap. II.*  
cas. 2.

, Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays, Vol. V. P.*  
II. art. 49.

Eclampsia febricosa, S. G. 133. sp. 17.

Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.

Tertiana tetanodes *Medici Beobacht. I. Band. p. 24.*

Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork, Ann.*  
Med. II. p. 163.


### I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati, L. III. cap.*  
14. *Lautter. Hist. Med. cap. II. cas. 10.*

Tertiana scorbutica, *Wedel. A. N. C. Dec. I. A. II.*  
Obs. 193.

Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon. Journ. de med.*  
1765. *Clegg. Minorc. p. 157.*

Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri de med. Ger-*  
man. apud *Roncagli Europ. med. p. 151.*



## K. Tertiana phlegmasia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1.

Sect. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103. sp. 14.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap.

IX. hist. 22. *Lautt.* loc. cit. cas. 19.

## 4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller,* prax. L. I.

Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. vener. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. *Stiffer.* in act. Helm-  
stad. *Laucis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6.

Illust. *Pringle* Diseases of the army, p. 98. *Ra-*  
*mazzini* const. epidem. rural. ann. 1690. Sect.

XI. *Van den Bosch.* Const. epid. verminos. ann.  
1760, &c.

## 5. Variat ratione principii \*.

\* Nullum quidem febrium intermittantium prin-  
cipium sufficiens praeter miasma paludum agnosci-  
mus; sed, cum miasma hoc non semper validum sit ad  
morbum arcessendum, nisi aëne potestates excitantes

simul

## 52 GENERA MORBORUM

Tertiana accidentalis, S. fp. 12. *Sydenham*, cap. 5.

Tertiana a scabie S. fp. 11. *Juncker*, tab. 80. *Hoffm.*

Il. p. 12.

### II. Interposita remissione tantum \*.

Tritaeophya, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae.

*Torti* Therap. Special. Lib. III. cap. 1.

simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

\* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit elferri possit. Tertianas autem, quas comitatus dixit *TORTI*, eas scilicet quae symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, enumeravi.

*Tertiana subcontinua*, S. sp. 19.

*Quotidiana deceptiva*, S. sp. 2.

*Amphimerina femiquintana*, S. sp. 24.

*Tritaeophya deceptiva*, S. sp. 10.

Ex tertianis comitatis *Torti* loc. cit. prae-  
cipuae sunt :

A. *Tertiana cholERICA* five *dySfenterica*, *Tort.* *ibid.*

*Lautter*, *Hist. med.* cas. 6. 16. 17. 20. *Morton*,  
App. ad Exerc. II.

B. *Tertiana subcruenta* five *atrabilaris* *Tort.* *ibid.*

Haec a *Cleghornio* nunquam visa est.

C. *Tertiana cardiaca* *Tort.* *ibid.* *Lautter*, *Hist. med.*  
cas. 15. 18. 23.

*Amphimerina cardiaca*, S. sp. 5. \*.

*Tritaeophya affodes*, S. sp. 6.

*Febris continua affodes*, V. 27.

\* *Amphimerinas* inter et *Tritaeophyas*, uti inter  
*quotidianas* et *tertianas* duplices, distinctio saepe dif-  
ficilis. Sed *quotidianas* *tertianis* multo rariores, et  
oeconomiam animale[m] in febres typi tertiani maxi-  
me proclivem esse norunt experti, hinc plures *am-*  
*phimerinas* ad *tertianas* remittentes retin. judicent  
autem *autoptae*.

- D. Tertianæ diaphoretica, *Tort. ibid.*  
 Tritæophya typhodes, S. sp. 4.  
 Tritæophya eiodes, S. sp. 5. \*.  
 Febris continua eiodes, V. 21.
- E. Tertianæ syncopalis *Tort. ibid. Lautter, cas. 11.*  
 12. 13. 15. 16.  
 Tritæophya syncopalis, S. sp. 1.  
 Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.  
 Amphimerina humorosa, S. sp. 6.  
 Febris continua syncopalis, V. 29.
- F. Tertianæ algida, *Tort. ibid. Lautter, cas. 13.*  
 Amphimerina epiala, S. sp. 3.  
 Amphimerina phricodes, S. sp. 7.  
 Tritæophya leipyria, S. sp. 9.  
 Tertianæ leipyria, S. sp. 23. *Valerenghi Med.*  
 Ration. p. 18.  
 Febris continua epiala et leipyria V. 19. et 24.
- G. Tertianæ lethargica, *Tort. ibid.*  
 Tritæophya carotica, S. sp. 7. *Lautter, 1. 7. 14.*  
 Tertianæ apoplectica *Morton. Exerc. 1. cap. IX.*  
 Hist. 25.  
 Tertianæ soporosa *Werlhof. de febr. p. 6.*  
 Febris epidemica Urbevetana *Lancif. de noxis pal.*  
 effluv. I. II. c. 3.

\* De typo febris sudatoriae *Boyeri Meth. à suivre dans les malad. epidem.* quam huc retulit Sauvagesius, ex ipsius Boyeri descriptione mihi non liquet, et ad typhum referri mallet.

Tertianarum remittentium exempla praecipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos *Hippocratis*. De Morb. Vulg. L. III. sect. 3.

Tritaeophya causus, S. sp. 2.

Febris ardens *Boerhaavii*, Aph. 738 ?

Remittens ardens sive causis, *Machride*, p. 360.

Tertiana perniciofa, quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis, et mille accidentibus periculosissimis implicata, existit. *Lud. Mercatus* de febris, Lib. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Diverfus* de febre pestilenti. cap. X.

Tertiana maligna pestilens *Riverii*, L. XVII. Sect. II. c. 1. et Sect. III. c. 3.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* I. I. Ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pestis phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus *Cober.* obs. castr. Hung. 1. obs. 6. &c.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Corn. Gemma*.

Febres pestilentes Aegyptiorum, *Alpin.* de med. Aegypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* Hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris fyneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664;  
et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Morton*. App. ad  
*Exerc.* II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut.  
ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad  
1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidenfis, *Fr. Sylvii* Prax. med.  
app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemicus Leidenfis 1669, *Fanois*, Diss. apud  
*Haller*. Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castren-  
ses epidemiae *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.*  
II. p. 38.

Febris cholericus minus acuta. *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidenf. ann. 1719. *Köker* apud  
*Haller*, Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, *S.* sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army;  
Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononienfis constitutio hiemalis 1729, *Beccari* in *A.*  
*N. C.* Vol. III. Obs. 48.

Amphimerina biliosa, *S.* sp. 22.

Remittens biliosa *Macbride*, p. 360.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann.  
1729.

Febris biliosa Laufanensis, *Cl. Tissot*. de febr. bilios.

*Tritaeophya Wratislavienfis*, S. sp. 3. *Hahn*. Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

*Tritaeophya Americana*, S. sp. 12?

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de Morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* Dif. of Barbadoes, variis annis, Lond. Med. Obs. IV. 24. V. 2.

Febris A. 1772. et seq. ad urbem novam Avenionensem, Soc. Royale de Medicine I. Histoire, p. 213.

Febris intermittens irregularis Tolosae 1772. Soc. Royale I. Mem. p. 14.

Febris intermittens et remittens a l'Isle Jourdain, A. 1777. Soc. Royale II. Hist. p. 145.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind*. Med. Edin. Diss. Inaug. 1768. Lond. Med. Obs. Vol. IV. art. 12.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Roupe* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind* Med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

*Tertiana remittens symptomatica* est.

*Tritaeophya lactea*, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. cas. 57.

## G. II. Q U A R T A N A.

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta duarum circiter horarum: Accessionibus pomeridianis.

H



## 58 GENERA MORBORUM

*Quartana Auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Sag.* 711.  
*Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. *Quartana* paroxysmis quarto quoque  
die singulis ; aliis diebus nullis.

*Quartana legitima*, S. sp. 1. *Sydenham* de morb.  
acut. cap. V.

B. *Quartana* paroxysmis quarto quoque  
die binis ; aliis diebus nullis.

*Quartana duplicata*, S. sp. 4. *Bonet.*

C. *Quartana* paroxysmis quarto quoque  
die tribus ; intermediis diebus nul-  
lis.

*Quartana triplicata*, S. sp. 16.

D. *Quartana* quae ex quatuor diebus ter-  
tium tantum a febre vacuum habet,

paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 5. V. 14. *Barthol. H. anat.*  
c. 1. 95.

## 2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet. Polyalth. vol.*  
1. p. 805.

Quartana comatosa, S. sp. 15. *Werthof. de febr. C.*  
*Pisonis Observ. de morbis a colluvie scrofi. obi.* 166.  
167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii Conf.* 379.  
380.

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton. Pyret. Exerc.*  
I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham de morb. acut.*  
cap. V.

Quartana splenetica, S. sp. 2. *Etmuller. Coll. consult. cas.* 25.

Quartana hepatica, *Macb. p.* 354.

## 3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III, p. 676. *Edinb. Eff.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr. sympt. cap. IX. H. 4 et 5.

Arthritis febrifequa, S. sp. 10.

Arthritis febricosa, S. sp. 10. *Werlkof.* de febr.

*Cockburn* de morbis navigantium, obs. 19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diff. IV. *Tim.* L. VIII. cas. 18.

## II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. *Sag.* 323. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

## Varietates sunt,

Tetartophya simplex, S. sp. 1. \*.

\* Quartanam continuam morbum rarissimum esse, testantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex *Franc. Joelis* operum tomo 3. citat SAUV. In loco autem citato, nihil ad rem pertinens inveniri; sed tomi quinti pag. 63. haec verba proferruntur,

*Amphimerina semiquartana*, S. sp. 23.

*Tetartophya semitertiana*, S. sp. 5.

*Tetartophya maligna*, S. sp. 6 *Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatenaria. Herst. L. 1. obs. 15.*

*Tetartophya carotica*, S. sp. 4. *Werlhof. de febr. Bianchi Hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.*

*Tetartophya splenalgica*, S. sp. 2. \*.

runtur. Febris quartanae “ Species veteres duas constituunt. *Quartanam continuam*, (quae mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico) et *Interpolatam*, quae frequentissima est.”

\* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert SAUV. et vult febrem ita a *Ferte* dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernelius : Sed quodammodo hic errasse SAUVAGESIUS mihi videtur. Nam febres quasdam Fernelianas vocat Fortis, Tom. II cent. II. obs. 35. et 36. non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris cujusdam, hepatis praesertim, laeae comitatae sint ; et mortuus quidem est Fernelius ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanae typum unquam exhibuit, non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernelii, operibus ejus praefixa, de eo morbo narrat.

## 62 GENERA MORBORUM

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pif.* in  
praefat. p. 33.

Amphimerina ipasmodica, S. sp. 16.

### E R R A T I C Æ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICAS  
S. pertinere putamus\*; et hic ideo earum  
varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Forest.*  
L. III. obs. 43. ex quartana ill. *Van Swieten*,  
Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerh.* apud ill. *Van*  
*Swieten* ibid. *M. Don.* L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I.  
Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187. 188.  
365. *Valles* Controv. L. V. c. 25. *P. Sai. Div.*  
in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII *Zacut.*  
*Luf.* P. M. L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N.  
C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70. *Arnold.* de febr.  
Stomach. epid. § IV. apud *Haller.* Diff. Pract.  
Vol. V. *De Haen* de divis. febr. div. iv. p. 9.

\* Vide *Senacum* de recondita febrium natura,  
L. I. Cap. 1.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Luf.* ibid.

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Luf.* ibid.

Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don.* L. III.

14. ex *Gentili*.

Erratica vaga, S. sp. 6. *River.* cent. III. obs. 32.

*Etmuller*, L. I. S. XV. c. 2.

### G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum : Paroxyfinis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.

*Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

#### I. Interposita apyrexia.

##### 1. Variat solitaria.

##### A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert* de febr. cap. 18.

## 64 GENERA MORBORUM

### B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel*. E. N. C.  
D. I. A. III. obs. 205. *Edinb. Med. Eff.* vol. I.  
art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton* Pyret.  
exerc. I. Hist. 27. *Van Swieten in Boerb.* p.  
534. Soc. Royale, II. Mem. p. 38.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid.* hist. 17.  
*Van Swiet.* *ibid.*

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

### 2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol. V.  
art. 49.

Ischias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton*, *ibid.*  
hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico-sputatoria, *B. Scharf*. E. N. C.  
D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.  
cit.

Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

Vespertinae vel symptomatice videntur frequentes.

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

## II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20. Sag. G. 321.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuæ *Auctorum*.

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. conf.

cas. 32. *River*. obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertianas pertinere, quorum plures supra retuli, vel symptomatice et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.



Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa *Bontii* et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

## SECT. II. CONTINUÆ\*.

Febres, sine intermissione, nec miasmato

\* *Quae sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat, Febrem Continuum esse, dixit SAUVAGESIUS; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat LINNÆUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi satis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, satis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum charactere satis patebit; nec dissentit expertissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione febrium, Divis. IV. Schol. I.; et apprimè sententiam nostram confirmat BRENDIUS, verbis sequentibus: “ Omnes namque febres nostrae, acutae, et inflammatoriae, et exanthematicae, et malignae, reliquaeve hujus generis, sunt continuae remittentes,*

paludum ortae, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, persistentes: Paroxyfinis quovis die binis \*.

*tentes, et luculenta intensio- rum remissionumque spatia integ- rant."* Brendel. Opuscul. P. II. Diff. XI. sect. 5.

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes et remissiones parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc praesertim, quod in febribus quibuscunque, ex paroxyfinis pluribus manifesto constantibus, paroxyfimus quisque, inter nycthemerae spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus oeconomiam ani- malem circuitus diurni legi cuidam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hecticis quibusque ad amissim subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continen- tem revera in rerum natura dari.

\* Cum continuam quamque ex paroxyfinis re- petitis consistere ponimus, saepe ambiguum fieri possit,

## 68 GENERA MORBORUM

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Sag.*

666. *Mach.* p. 303. *Boerb.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stabl.* Caf. magn. 35.

Caf. min. 87. *Junk.* 58. *Sennert.* de febr. L.

II. cap. 2. et 10.

possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentium, ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datae satis facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostrae recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuae dignosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, saepe manifesto et maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuae saepe certe cognosci possint.

## G. IV. S Y N O C H A\*.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

\* Februum continuarum divisio, a GALENI temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior praesertim, qua praecipue usi sunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et SAGARUS, manifesto inepta est. Vide *Prolegomena*, pag. XXV. et pag. XXXIII. et XXXIV. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem februum continuarum in *Inflammatorias* et *Nervosas*. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dudum recepta sunt; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, dum definitiones subjunctae ab errore quovis praecavere possint.

## 70 GENERA MORBORUM

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha, five febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II.

105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerb.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerb.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

### Varietates sunt,

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.

cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* sect. V.

c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.

c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad

tractat. de hydropo.

### Symptomaticae sunt,

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. Var. D.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. V. E.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 2. V. A.

## G. V. T Y P H U S.

Morbus contagiosus ; calor parum auctus ;  
pulsus parvus, debilis, plerumque fre-  
quens ; urina parum mutata ; sensorii  
functiones plurimum turbatae ; vires  
multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. *Sag.* 677.

Species sunt,

1. Typhus (*petechialis*) plerumque cum  
petechiis.

Variat gradu \*.

\* Morbos gradu solum differentes nominibus di-  
versis insignire nequaquam convenit ; cum autem  
nuperis

## 1. Typhus mitior.

Febris maligna hectica five lues *νευρωδης* convulsiva,  
*Willis* de morb. convulsiv. cap. 8. \*.

nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibuscvis differentem, nomine Febris *Nervosae* appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo *Typhi mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosas aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris *Putridae* recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adesse puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praesertim putridae adpellatae sunt, febres indigitasse, uti ex appositis variorum auctorum appellationibus fatis patebit.

\* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *Νευρωδης*, vel nervosae, febribus quibuscvis datae;  
quam

Febris pestilens *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II.

cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni *Foreſt.* L. VI.

obſ. 26.

Febris hectica pestilens *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.

Febris nova ann. 1685. *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa *Wintringh.* Comm. Noſolog.

ad ann. 1720, 1721.

Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap. 8.

Ed. Med. Eff. II. 18. IV. 23. V. 48. *Macb.* p. 304.

Soc. Royale I. Mem. p. 23,

Febris contagiosa. *Lind* on fevers and infection  
*paſſim.*

Typhus nervosus, S. ſp. 2.

Typhus comatosus, S. ſp. 3.

Tritacophya typhodes *Mangeti*, S. ſp. 11. *Raym.*

*Fort.* de febribus, p. 24. M. 304.

## 2. Typhus gravior.

Febris pestilens, *P. Sal. Diverſ.* de febre pestilenti.

Febris pestilens *Ægyptiorum Alpin.* de med. *Ægypt.*

L. I. cap. 14.

quam protinus Angli, non tamen niſi nuper admo-  
dum aliarum regionum medici, uſurpati ſunt.



## 74 GENERA MORBORUM

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Cephalitis Epidemica, ann. 1510. S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert.* de febribus, L. IV.  
cap. 10.

Febris maligna pestilens *River.* L. XVII. sect. III.  
cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis,* de febribus, cap. 14.

Febris Senegallensis, Lond. Med. Obs. II. 21.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aëre ad ann.  
1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Huxham* de aëre ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. *Pringle*, Diseases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten*, Maladies des armées, p. 136. Soc. Royale II. Mem. p. 53. Ibid. III. Mem. p. 45. and 55.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant *Henr. Maii* et *A. Ph. Koph.* Dis. apud *Hallerum*, tom. V.

Febris Hungarica five castrensis *Junker.* 74. et *plurimum Auctorum* \*.

\* Morbum five febrem Hungaricam ad tertianas remittentes, cum SAUVAGESIO et Ill. PRINGLE,  
supra

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742.

*Scrinci*. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis, *Sennert*. L. IV. cap. 13. *River*.

prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm*. II. p. 84.

*Juncker*. 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Lud-*

*wig*. Inst. med. clin. No. 146. *Schreiber* von

erkentniss, und cur der Krank heiten. p. 126.

*Monro*, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker* 72.

*Hoffm*. II. 75. *Eller* de cogn. et cur. morb. Sect. VI.

Febris putrida, *Macb*. p. 305.

Febris catarrhalis putrida 1768. *De Mertens* Obs.

cap. 1.

Febris putrida biliosa 1769. *De Martens*, cap. 2.

Febris putrida nervosa 1770. *De Martens*, cap. 3.

Exempla febrium petechialium sunt frequentia.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant, *Fracaflorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (*Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quæst. 39.*), et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibuscvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

## 76      GENERA MORBORUM

Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*, de febr. peticul.

Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672. *Donckers*, Idea febris petechialis.

Febris petechialis epidemica, Pofonii 1683, *C. F. Loeu* in App. ad A. N. C. Vol. II.

Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692. *Ramazzini*. Const. Mutinensis, Oper. pag. 187.

Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm.* II. p. 80.

Febris petechialis Wratislaviae, ann. 1699. *Helwich*, Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII. obs. 132. p. 616.

Febris epidemia Lipsiae 1718. *M. Adolph.* A. N. C. III. Obs. 131. p. 296.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. *Rogers*, Essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis ann. 1719. et seq. *M. o Connel* Observ. de morbis.

Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734. *Valcharengbi* Med. ration. Sect. III.

Febris petechizans Petropoli 1735, *Weitbrecht*. Diss. apud Haller. tom. V.

Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Hassia, *Ritter*. A. N. C. vol. VII. obs. 4.

Febris petechialis epidemica Vigorniae et aliis Angliae locis. *Wall's Works*, p. 337.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau*.

A. N. C. vol. VII. obf. 5.

Febris petechialis epidemica Silesiae 1741 et seq.

*Brandhorst*. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757, *Hafsenohrl*. Hist. med. cap. 2.

Febris petechialis epidemica Lipsiae 1757. *Ludwig*.

Adversar. tom. I. pars 1.

Febris petechialis epidemica variis Germaniae lo-

cis ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

Febris epidemica maligna a Coutances 1772 et

1773. Soc. Royale I. Mem. p. 23.

Febris petechialis nervosa a Dijon 1760 et 1761.

Mem. par *Maret* 1775.

## II. Typhus (*icterodes*) cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae Occidentalis *Warren*, Malignant Fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* on the Yellow Fever of South Carolina. *Edinb.* Phys. Litter. Essays, Vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae Occidentalis, *Edinb.* 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

## 78 GENERA MORBORUM

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forest.* L. VI. obf. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *Le Svette Gallorum, Meyferey*

*Meth. aisé, &c. Ejusd.* Maladies des Armées 250.

*Boyer* Methode a suivre dans les maladies epidemiques? *Tessier, Soc. Royale II.* Mem. p. 46.

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9.

Nobis non liquet.

### G. VI. SYNOCHUS\*.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerh.* 730.

\* Cum plures febres nec inflammatoriae nec nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad

Sy-

Varietates ex Sauvagesio sunt.

Synochus fanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.*  
de morb. acut.

Synochus fudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667.  
*Sydenh.* ibid.

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenh.*  
ibid.

Febris continua putrida annor. variorum. *Win-*  
*tringham* Com. Nosologicum.

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

Synocham vel ad Typhum facile referendae; genus Synochi, cujus typus hisce regionibus frequens conspicitur, hic inferui. Inter Typhum tamen et Synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum Synonyma auctorum referenda, sunt, dubito. Quae vero hic subjunguntur, a SAUVAGESIO species dictae, ad Synochum fatis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

## 80 GENERA MORBORUM

De syncho variolode, S. sp. 3. et

Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

Nobis non satis liquet, et minus adhuc de

Syncho anniverfaria, S. sp. 9.

Syncho spermatica, S. sp. 10.

Syncho tarantata, S. sp. 11.

Complicata est

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Et symptomatica est

Synochus a scabie, S. sp. 15.

## H E C T I C A.

Febris quotidie revertens ; accessionibus meridianis et vespertinis ; remissione, rarius apyrexia, matutina ; plerumque furoribus nocturnis, et urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente\*.

Hæctica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.

Med. Transf. II. 1.

\* Cum febrium in numerum, hæcticam receperint Nosologi omnes, eam etiam cum charactere hic apponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum  
nun-

Ex Sauvagesio species sunt,

Hæctica chlorotica, S. sp. 3.

Hæctica syphilitica, S. sp. 4.

Hæctica scrophulosa, S. sp. 5.

Hæctica a calculis, S. sp. 6.

Hæctica hydropum, S. sp. 7.

Hæctica verminosa, S. sp. 9.

Hæctica cachectarum, S. sp. 10.

Hæctica fluxuum, S. sp. 11.

Hæctica infantilis, S. sp. 1. Charactere caret, et nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur.

Hæctica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hæctica lymphatica, *Baglivi* S. sp. 12. et

Hæctica nervea, *Cl. Lorry*, S. sp. 13.

Nobis non liquet.

nunquam nisi symptomatice observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hæcticam revera symptomatice esse, ex SAUVAGESII speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I. pag. 319.

L



## O. II. PHLEGMASIÆ.

Febris fynocha ; phlogosis ; vel dolor topicus, simul laesa partis internae functione ; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae,  
S. Cl. III. O. I. II. *Sag.* 605. \*.

\* Haec phlegmasiarum in membranosas et parenchymatosas divisio prorsus inepta est ; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet ; dein, quod partes membranosae et parenchymatosae non satis certo distinguuntur ; et hinc Metritis, quam inter membranosas recenset SAUVAGESIUS, a LINNÆO et SAGARO inter parenchymatosas collocatur ; denique, quod phlegmasiae quaedam, ut hepatitis, vel membranosae vel parenchymatosae esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud LINNÆUM et SAGARUM institutio,

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuæ compositæ inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

## G. VII. PHLOGOSIS\*.

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et  
tensio dolens.

Species sunt,

I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido;  
tumore circumscripto, in fastigium ple-  
rumque elevato, sæpe in apostema abe-  
unte; dolore sæpe pulsatili.

*Phlegmone Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.  
*Sag.* 299. *Macb.* p. 418.

tutio, in qua neuter quidem satis accuratus est. Ma-  
le enim phlegmone a LINNÆO musculosa dicitur,  
nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius  
musculosa, a SAGARO ad musculosas in universum  
refertur.

\* Pro nomine generis cujus species est Erythema,  
minus recte in priore editione usurpatum fuit phleg-  
mone. Novum nomen necessarium nobis videbatur,  
et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

## 84 GENERA MORBORUM

Inflammatiō, L. 231. *Boerb.* 370. *Junck.* 20.

### 1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352. *Sag.* 23. *Macb.*  
p. 422.

Terminthus, V. 381.

Papula, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

### 2. Variat sede\*.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. G. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

\* An frequentes pro totidem speciebus recenseri  
possint, iudicem peritiores.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunefia, V. 167.

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctenas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11. *Sag.* 16.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343. *Macb.* 421.

Hieropyr, V. 344.

## 2. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353. *Sag.* 24.

Carbo et carbunculus *Auctorum*. *Macb.* p. 423.

Erythema gangraenosum, S. fp. 7.

## 2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. fp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. fp. 2.

Erysipelas ambustio, S. fp. 4.

## 86. GENERA MORBORUM

Combustura, L. 245.

Combustio, *Boerb.* 476.

Encaufis, V. 347.

Erythema ab acri alieno applicato,

Erysipelas Chinense, S. fp. 7.

Erythema ab acri inquilino,

Erythema intertrigo, S. fp. 5.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema a compressione,

Erythema paratrima, S. fp. 6.

Erythema a punctura, S. fp. 9.

Erysipelas a vespis, S. fp. 19.

Psudracia a vespis, S. fp. 2.

### 3. Variat complicata.

Erythema cum phlegmone,

Erysipelas phlegmonodes *Auctorum.*

Erythema cum oedemate,

Erysipelas symptomaticum, S. fp. 6.

Phlogosis sequelae sunt,

## A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore et

pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abcessus, L. 132. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

*Macb.* p. 414.

Pustula, L. 274.

## G A N G R Æ N A.

Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

Gangraena, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203.

*Boerb.* 388. 419. *Macb.* p. 415.

## S P H A C E L U S.

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

## §§ GENERA MORBORUM

### G. VIII. OPTHALMIA.

Rubor et dolor oculi ; lucis intolerantia ;  
plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Sag.* 231.

*Junc.* 24. *Macb.* p. 423.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammati oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt,

#### I. Idiopathicae.

1. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica  
adnata, et ei subjacentibus membranis,  
five tunicis oculi.

#### A. Variat gradu phlogosis externae.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctenodes, S. sp. 21.

## B. Variat affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideae, S. sp. 13.

Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.

2. Ophthalmia (*Tarfi*) cum tumore, erosione, et exudatione glutinosa tarfi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia ficca, S. sp. 5.

## II. Symptomaticae.

## 1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.



## 90 GENERA MORBORUM

### 2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

### G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. *Sag. G. 301. Boerb.*

771. *Hoffm. II. 131. Junck. 63. Macb. p. 432.*

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. *Sag. G. 310. \**

\* Cum symptomata nulla dentur quae semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum ejus, sive meningum, certo distinguere possint; neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGESIO, LINNÆO, et SAGARO, adhibitas confirmant,

*Cepha-*

Sphacelismus, L. 32.

Siriasis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic  
ponere licet, et cujus synonyma sequen-  
tia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriasis, S. sp. 4.

Siriasis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

## II. Phrenitides Symptomaticae sunt.

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.

*Cephalitidem*, S. G. 109. *Sag.* G. 310. et *Sphacelismum*,  
L. 32. pro generibus a *phrenitide* diversis admittere  
nolui, et ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phre-  
nitidis, posui.

Recte monet VOGELIUS signa phrenitidis, vel ut  
vocat phrenismi, hoc est, inflammationis cerebri aut  
membrarum ejus, admodum ambigua esse.

## 92 GENERA MORBORUM

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1510, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

## G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes ; rubor et dolor faucium ; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu,

Cynanche, S. G. 110. L. 33. *Sag.* G. 300.

Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junc.* 30.

Angina inflammatoria, *Boerb.* 798.

Species sunt,

I. Cynanche (*tonfillaris*) membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre fynocha.

Cynanche tonfillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. *Boerb.* 805.

II. Cynanche (*maligna*) tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentinibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.

Hispanis *Garotillo*, *Lud. Mercat.* consult. 24.

## 94 GENERA MORBORUM

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill*, Account of the ulcerous fore throat Edit. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous fore throat, from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical History, Boston 1736. Lond. Med. Obs. I. 20.

Angina epidemica, *Ruffel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diss. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Angina maligna, *Johnstone* on the malignant angina, &c. Worcester 1779. Wall's Works. p. 58.

### III. Cynanche (*trachealis*) respiratione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 12.

Angina interna, *Tulp.* I. 1. obs. 51

Angina pernicioſa, *Greg. Horſt.* Obſerv. L. III.  
obſ. 1.

N. An haec Sauvageſii ſynonyma et ſequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti ; ſequentia autem ad morbum characteris dati manifeſto pertinere videntur.

Suffocatio ſtridula, *Scotis* the CROUP. Cl. *Home* on the Croup.

Aſthma infantum, *Millar* on the aſthma and chin-cough.

Aſthma infantum ſpaſmodicum, *Ruſſ*, Diſſertation, London 1776.

Cynanche ſtridula, *Crawford*, Diſſ. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* hiſtory of the weather.

Morbus ſtrangulatorius, *Starr*, Phil. Tranſ. No. 495. \*

\* An hic morbus ad cynanchen malignam, an ad trachealem pertinet, mihi non certo conſtat, et ſaepe de eorundem morborum apud plures auctores deſcriptionibus itidem incertus ſum.

## 96 GENERA MORBORUM

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. 2  
Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel*, *Oecon.* nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadosis, ann. 1758.  
*Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Angina polyposa, five membranacea *Michaelis*,  
Argentorati 1778, et *Auctores* ab ingenioso et  
erudito *Michaele* allegati.

Morbus anginae polyposae analogus, Soc. Royale II.  
Hist. p. 206.

IV. Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in  
imis praesertim faucibus; degluti-  
tione maxime difficili, dolentissima;  
respiratione satis commoda, et febre  
synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et  
cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta, *Boerb.* 804.

V. Cynanche (*parotidea*) cum tumore ex-  
terno parotidum et maxillarum glan-  
dularum magno; respiratione et de-  
glutitione parum laesis; febre syno-  
cha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREILLONS et OURLES, *Tiffot* Avis au peuple, No. 116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS, *Ruffel*,  
Oecon. natur. p. 114. SCOTIS, the BRANKS.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

Offervazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Offervazioni di Targ. Tozzetti, Racolta ima,  
p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15.  
vel ad malignam, S. sp. 3. vel ad Scar-  
latinam pertinere videtur.

Cynanchæ fymptomaticæ funt,

a. A caufis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginofa, S. sp. 12.

Febris anginofa, *Huxham* de aëre.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dyfenteria, S. sp. 13.



## b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

## G. XI.      PNEUMONIA\*.

Pyrexia ; dolor in quadam thoracis parte ;  
respiratio difficilis ; tussis.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136. *Macb.* p. 435.

\* Ab omni aevo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum saepe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, saepius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod, si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per symptomata vix certo cognosci posse ; et, utcunque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usus medicinae

Species sunt,

- I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

cinae parum omnino contulisse. Hisce igitur perpen-  
 pensis, phlegmatis pectoris interni non nisi genus  
 unicum constituere, cum HOFFMANNO expertissi-  
 mo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic sub  
 nomine Pneumoniae posuimus. Symptomata, quae  
 pro characteristicis adhibuimus, cum quae in omni  
 phlegmatis pectoris interni semper adsint, et in qua-  
 libet praecipua sint, ea recte characterem genericum  
 constituere videntur.

An species diversae vere statuendae sint, anceps  
 haereo. Sed, opinionibus et consuetudini medico-  
 rum aliquid concedere volens, peripneumoniae et  
 pleuritidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel  
 ex propria observatione, eas distinguere liceat, cha-  
 racteres specificas dedi. Interim tamen observari ve-  
 lim, inter illos morbos, utcumque aliquando distinc-  
 tos, limites accuratos plerumque non ponendos esse.

## 100 GENERA MORBORUM

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Sag.*  
G. 311. *Boerb.* 820. *Juncker*, 67.

### 1. Peripneumoniae idiopathicae simplices,

Peripneumonia pura five vera *Auctorum*, S. sp. 1.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.* de  
cauf. et fed. Epist. XX. art. 30. 31. \*.

### Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha †, *Sydenh.* sect. 6. cap. 4.

*Boerb.* 867. *Morgagni* de cauf. et fed. Epist.  
XXI. 11.—15.

\* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius  
pertinet haec varietas, mihi non certo constat.

† Peripneumoniam *notham* a *vera* gradu tantum  
differre opinor ; ideoque uti varietas hic appofui. In  
eo quidem differre puto, quod in peripneumonia  
*notha* inflammatio fit lenior, et affluxus humorum in  
pulmones copiofior, quam in *vera*. Cum autem in  
*notha* fymptomata pyrexiae, doloris, dyspnoeae, et  
tuffis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse  
possint, minime mirandum si hujus morbi apud di-  
versos auctores descriptiones parum uniformes fint,  
et necne morbus sub titulo peripneumoniae nothae

## 2. Peripneumoniae idiopathicae complicatae febre \*.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. †.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

a diversis auctoribus descriptus idem revera fit, dubia quaedam moverit doctissimus MORGAGNI. Peripneumoniae tamen omnibus de hac re dictis, et cum observationibus pluribus apud ipsos aegros factis collatis, nihil dubito quin morbus a SYDENHAMO et BOERHAAVIO, sub titulo *peripneumoniae nothae* descriptus, unus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA in FRANCISCO CORALIO, vel morbum in celebri ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI observatum, re ipsa diversum fuisse puto. Vide First Lines of the Practice of Physic, edit. 1784. § CCCLXXVI.

\* Cum morbi diversi simul complicati sint, saepe, quis illorum pro morbo primario habendus sit dubitari potest; nec in hac re me ubique recte judicatum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius iudicio usus sum; in plerisque vero SAUVAGESIUM secutus sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studiorum complicationes istas quomodocunque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut soleo, secutus, hanc et tres sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen pro una eademque habere vellem.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

### 3. Peripneumoniae symptomatae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthificorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pulsu duro;  
dolore, plerumque lateris, pungente,  
sub inspiratione praefertim aucto; de-  
cubitu in latus molesto; tussi dolen-  
tissima, initio sicca, postea humida,  
saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Sag.* G. 303.  
*Boerb.* 875. *Junck.* 67.

Paraphrensis, S. G. 102. L. 26. \*.

\* In morbo qui vulgo *paraphrensis* vel *paraphre-  
nitis*, et rectius a SAGARO *diaphragmitis*, appellatur,  
pleurae super diaphragma extensae inflammationem  
adesse, et in ea morbum consistere agnoscunt medici

Paraphrenitis, V. 55. *Boerb.* 907.

Diaphragmitis, *Sag.* G. 304.

# i. Pleuritides idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. *Verna* princeps morb. acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thef. II.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. parapleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, peripneumo-pleuritis *Auctorum.* *Baronius* de pleuripneumonia.

medici omnes; non recte igitur uti genus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recenseri potest; cum plerumque nulla alia praeter illa pleuritidis symptomata ostendit. Quae a plurimis huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonius, et delirium phreniticum, certe non semper adfunt. Primum, quod nunquam vidi, certe rarissimum est; et posterius, alias etiam pneumoniae species saepe comitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata, quantum a gradu pyrexiae, vel diathesis phlogisticae, pendere videtur.

III. *Halleri* opuscul. patholog. ob. 13. *Morgagn.* de fed. et cauf. Epist. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. *Huxham* Dif. on pleurifies, &c. chap. I. III. *Pringle* Diff. of the army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. fp. 13. *Bianch.* Hist. hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. fp. 15. *Morgagn.* de cauf. et fed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. fp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediaftini, S. fp. 4. P. *Sal. Div.* de affect. part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de Avenzoare.

Mediaftina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. fp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, S. fp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. fp. 1. *De Haen*, Rat. med. I. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. fp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. fp. 3.

De inflammatione mediaftini, pericardii, et diaphragmatis Vide *Morgagn.* de cauf. et fed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* ad *Boerb.* 913.

## II. Pleuritides complicatae.

### 1. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoſa, S. sp. 11.

Pleuritis bilioſa, *Bianch.* Hiſt. hep. vol. I. p.  
236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis peſtilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

### 2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p.  
233.

## III. Pleuritides ſymptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminofa, S. sp. 8. *Verna* pleur. p. I.  
cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et  
cauſ. XXI. 43. 44.

Pleuritis ſtomachalis, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p. 232.



## 106 GÉNÈRA MORBORUM

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

### IV. Pleuritides falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol.* Pentac. 1.  
obf. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniae sequelae sunt.

## V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Vomica *Boerb.* 835. *Junck.* 35. \*.

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

\* Vomicam vocamus quam vomicam clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicae apud LINNÆUM et VOGELIUM vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

## E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

## G. XIII. C A R D I T I S \*.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas;

\* Recte omnino dixit VOGELIUS, *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora*, et ita etiam sensisse videtur LINNÆUS, cum apud  
illum

## 108 GENERA MORBORUM

spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

### I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac.* Traité de coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel*, Mem. de Berlin, 1756.

Erysipelas pulmonis, *Lomm.* Observ. Lib. II.

### II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac.* ibid. chap. 6.

## G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogisticos recensetur. Certe novimus, pericardium saepe inflammatum fuisse sine aliis praeter peripneumoniae signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant  
sequentes, pro speciebus peritonitidis re-  
cenferi possent.

I. Peritonitis (*propria*) in peritoneo stric-  
tius dicto, five in peritoneo, abdomen  
intus succingente.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med. L. 1.  
obf. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obf. 341.  
*Morgagn.* de sed. LVII. 20.

II. Peritonitis (*omentalis*) in peritoneo, per  
omentum extenso.

Epiploitis, S. G. 106. *Sag.* G. 308. \*.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swie-*  
*ten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132. *Hulme* on  
the puerperal fever.

\* Tum epiploitis, tum Mesenteritis, ut Peritoni-  
tidis species hic recensetur, non quam quod ejusdem  
continuae membranae sint affectiones, quam quod  
nulla fere signa dari possunt, quibus a peritonitide,  
strictius dicta, dignosci queant.

III. Peritonitis (*mesenterica*) in peritoneo,  
per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

G. XV. G A S T R I T I S.

Pyrexia typhodes ; anxietas ; in epigastrio  
ardor et dolor, ingestis quibuscumque auc-  
tus ; vomendi cupiditas, et ingesta pro-  
tinus rejecta ; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. Sag. G. 306.

Ventriculi inflammatio, Boerh. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto,  
pyrexia vehementi \*.

\* Tum gastritis, tum enteritis duarum esse spe-  
cierum, quarum una phlegmonodea, altera erysipela-

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller*, obs. 14. hist. 3. *Lient*. Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4. \*.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

## 2. A cauſis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

## B. Gastritis (*erythematica*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore eryſipelatoſo in faucibus apparente.

toſa dici poteſt, mihi ex pluribus obſervationibus factis certo conſtat ; et ejuſmodi ſpecies itaque hic re- cenſui, etſi fatendum ſit, gaſtritidis eryſipelatoſae, et magis adhuc enteritidis eryſipelatoſae, ſigna ſaepe obſcura et incerta eſſe. De his vero monere volui ut diligentius inquirent poſteri.

\* Quam hic gaſtritidem eryſipelatoſam dixit SAUVAGESIUS, omnino phlegmonodeam eſſe mihi videtur.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pun-  
gens, tendens, circa umbilicum tor-  
quens; vomitus; alvus pertinaciter ad-  
stricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. Sag. G. 307.

Intestinorum inflammatio, Boerb. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio,  
*Hoffm.* II. 170.

I. Idiopathicae.

Species sunt,

1. Enteritis (*phlegmonodaea*) dolore acuto,  
pyrexia vehementi, vomitu et alvo ad-  
stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb.* 963.

2. Enteritis (*erythematica*) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Species fymptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

## G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus\*.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Sag.* G. 312.

*Boerb.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66. *Macb.* p. 446.

\* Inter fymptomata hepatitidis, *colorem faciei flavescentem*, posuit tum SAUVAGESIUS, tum SAGARUS, et hic etiam addit, *urinas icteritias, biliosas, et serum*



Variat.

I. Acuta signis in charactere dictis dignoscenda.

II. Chronica. Haec saepe nulla quibus dignoscatur signa praebet; aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatiditis causis quibusdam praegressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a pressu hypochondrio dextra vel a decubitu in latus sinistrum sentito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

*Sauvagesii* species sunt,

*serum sanguinis missi et crusta subflava*; sed haec symptomata bilis regurgitantis vel resorptae rectius a LINNÆO et VOGELIO omissa fuisse censeo; nam ejusmodi symptomata non tantum non perpetua, sed etiam rarissima sunt.

Hepatitis erysipelatosa, S. sp. 1. \*.

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianch. Hist. hep.*  
tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4. †.

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

\* De erythemate vel erysipelate, quod vocant, viscerum, minus recte sensisse medicos censeo; nam, me saltem iudice, erythema non nisi superficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villosa, epidermidi externae continua et analogae, afficere potest. Nullum igitur erysipelas pulmonis, de quo scripsit LOMMIUS, *Observ. lib. 2.* agnosco; nec hepatitisidem quandam a SAUVAGESIO hic erysipelatofam recte dictam esse puto, et hepatitisidem quidem ex AMATO hic descriptam revera phlegmonodeam fuisse credo.

† Quin ex contusione vel aliis causis oriri possit inflammatio cystidis felleae, vel ductus choledochi, nullus dubito; sed quibus signis cognosci queat, nisi in uno casu, non novi. In ictero, scilicet, cum dolore in regione epigastrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu choledochi haerente, inflammationem ductus cystici saepe ortam fuisse, omnino censendum, et ne oriatur semper cavendum.

## 116 GENERA MORBORUM

Hepatitis suppurans, S. sp. 6. *Cheston's Pathol. Inq.*

Chap. III. Sect. 2. et app. Case 12.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

### G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67. *Sag.*

G. 313. *Macb.* p. 448.

Lienis inflammatio, *Boerb.* 958. et ill. *Van Swieten.* Comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Forest,* L. XX.

Obf. 5. 6. *De Haen,* apud *Van Swieten,* p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenaigia suppuratoria, S. sp. 3.

### G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag.* G. 314.

Species

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7. *Cheston's* Inq.  
Chap. II.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. C Y S T I T I S.

Pyrexia ; hypogastrii tumor et dolor ; mic-  
tio frequens dolorifica, vel ischuria ; te-  
nesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. *Sag.* G. 309.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

Species sunt,

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor,  
et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107, *Sag.* G. 315.

Inflammatiō et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa, et plerumque evidente  
causa; pyrexia; dolor circa articulos,  
musculorum tractum sequens, genua et  
reliquos majores, potius quam pedum  
vel manuum articulos, infestans, calore  
externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerb.*

1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Myofitis, *Sag.* G. 301.

Lumbago, S. G. 212. V. 138. *Sag.* 169.

Ischias, S. G. 213. V. 138. *Sag.* 170.

Pleurodyne, S. G. 148. V. 138. *Sag.* 254. *Mach.*

p. 511.

### Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

### Variat fede.

#### A. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. G. 212. sp. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

#### B. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

#### C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, *Boerb.* 878.

## Species symptomaticae.

Lumbago plethorica, S. fp. 3.

Ifchias fanguineum, S. fp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. fp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. fp. 7.

Ifchias hystericum, S. fp. 3.

Pleurodyne hysterica, S. fp. 6.

Rheumatismus flatatorius, S. fp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. fp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. fp. 9.

Rheumatismus scorbuticus, S. fp. 4.

Lumbago scorbutica, S. fp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. fp. 11.

Ifchias syphiliticum, S. fp. 7.

Pleurodyne venerea, S. fp. 5.

Lumbago sympathica, S. fp. 13.

*a mesenterii glandulis induratis,*

*a pancreate tumido, purulento, schirroso, putri,*

*ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,*

*a rene schirroso, putrefacto,*

*ab abscessu circa venae cavae bifurcationem,*

*a vermibus intra renes.*

Lumbago a faburra, S. fp. 8.

Pleurodyne a cacoehylia, S. fp. 7.

Rheumatismus faltatorius verminofus, S. fp. 8.

Ifchias verminofum, S. fp. 8.

Pleurodyne verminofa, S. fp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. fp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. fp. 14.

Lumbago pseudoifchuria, S. fp. 16.

Lumbago ex aneurifmate, S. fp. 11.

Pleurodyne ex aneurifmate, S. fp. 10.

Pleurodyne a rupto oefophago, S. fp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. fp. 13.

Ifchias a fparganofi, S. fp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. fp. 14.

Pleurodyne phthifica, S. fp. 8.

Rheumatismus necrofeos, S. fp. 14.

Rheumatismus convulfivus, S. fp. 15.

Ifchias gravidarum, S. fp. 4.

Lumbago partus, S. fp. 7.

Lumbago a nifu, S. fp. 10.

Ifchias a fubluxatione, S. fp. 9.

VOL. II.

Q



## 122 GENERA MORBORUM

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a fatyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricofus, S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricofa, S. sp. 15.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi sequela est,

### ARTHRODYNIA\*.

Post rheumatismum, nifum violentum, vel  
subluxationem; dolores artuum ve

\* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus fit, nomen simplex, uti genus omne, habere oportet, et hujusmodi nec ineptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, et cum inter utrumque morbum saepe limi-

tes

musculorum, sub motu praesertim, aucti, plus minusve fugaces, calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, rigidi, facile, et saepe sponte frigescentes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus *Auctorum*.

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum saepius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

Lond. Med. Obs. IV. 5.

### G. XXIII. ODONTALGIA\*.

res vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit; et si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

\* In priori Nosologiae methodicae nostrae editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a  
rheu-

## 124 GENERA MORBORUM

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum,  
a carie dentium.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Sag. G.*  
157. *Junck.* 25. *Macb.* 509.

Odontalgia, five rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.*  
II. 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic  
itaque uti genus diversum posui.

Etiamfi odontalgiam a frigore et aliis irritamen-  
tis aliquando fulcitari videtur, cariem dentium, dia-  
thesin phlogisticam inducentem, semper subesse puto.  
Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui  
rheumatismum exacte satis referunt; sed de iis nobis  
non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem  
Clariff. D. COTTUNNII, *Ischias nervosa*, rheuma-  
tism ab acri nervos irritante orti exemplum aliud  
haberemus; sed neque phaenomena a Cottunnio re-  
lata, neque ratio medendi, neque sectiones cadave-  
rum, ejusmodi morbum unquam exstitisse mihi pro-  
bant; ideoque neque hic, neque alibi, *Ischiadem ner-  
vosam Cottunnii* inter rheumatismi species recensui.

- Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.
- Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.
- Odontalgia arthritica, S. sp. 6.
- Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.
- Odontalgia hysterica, S. sp. 3.
- Odontalgia stomachica, S. sp. 9.

#### G. XXIV.    P O D A G R A \*.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. *Boerb.* 1254.

Febris podagrica, V. 69.

\* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, et *podagra* nomine, utpote typum morbi praecipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. *Sag.* G. 142.

*Macb.* p. 487. Lond. Med. Obs. VI. 20.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II.

339.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Affectus spastico arthritici, *Junck.* 46.

Recte forsitan SAUVAGESIUS, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit; sed varietates frequentes notari possunt.

I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. \*.

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

\* Ut solitus sum, SAUVAGESII varietates, five species quas vocat, hic appono; sed tum quod species ejus non semper bene definitae sint, tum quod podagra

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox infecuta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

Podagra regularis et atonica a se invicem non semper prorsus disjungantur, in apponendis loco idoneo SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore non spondeo.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. fp. 3.

Arthritis scorbutica, S. fp. 7.

Arthritis syphilitica, S. fp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. fp. 13.

Arthritis Americana, S. fp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. fp. 15.

## G. XXV. ARTHROPUOSIS\*.

Dolores artuum vel partium musculofarum, saepe post contusionem, profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel

\* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocace, et phlogosi, distinguendum, ubique satis certo adhibendus, dari posset.

modicus, et diffusus; phlogosis nulla;  
pyrexia primum lenis, tandem hectica,  
et simul partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce*, Practice of  
Physic, P. II. pag. 70. *Cheston*, App. Case 4  
et 5.

Lumbago apostematosa, S. sp. 12.

Lumbago ab arthrocace, S. sp. 17.

Ischias ex abscessu, S. sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen*, Rat. Med. Vol. I.  
C. xxxii.



## O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae\*.

Exanthemata, *Sag.* Cl. X.

\* Quo charactere recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortae, solae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendae sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendae sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, et forsitan tum *miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitae aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non contagiosis, quae saepe in decursu vitae aliquem afficiant  
vel

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

## G. XXVI. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastrio pressio, dolore.

vel afflicere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formae, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex charactere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad characteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos plerosque recensui.

## 132 GENERA MORBORUM

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem, et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas, sive foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. *Sag.* G. 290.

Febris variolosa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Species sunt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretæ, *Sydenh.* Sect. III.  
cap. 2.

Variolae discretæ simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. *Helv.* sp. 2.

Variolae anomalæ, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*

Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta filiquosa, S. sp. 7. *Friend* Oper.  
p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.  
sp. 3.

H. Variola (*confluens*) pustulis numerosis,  
confluentibus, circumscriptione irregu-  
laribus, flaccidis, parum elevatis; febre  
post eruptionem persistente.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-*  
*denh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs.  
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pif.* obs. 149. \*.

\* Pro specie variolae, has vesiculas hic posuit  
SAUVAGESIUS. Sed vesiculae a Pifone descriptae  
potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

## 134 GENERA MORBORUM

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect.

V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola fanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

### G. XXVII. VARICELLA.

#### Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Variola lymphatica, S. sp. 1.

Anglis, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*,

Vol. II. Art. 2. near the end. *Heberden*, Med.

Transact. Art. 17.

## G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. *Sag.* 293.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Lond. Med. Obs. IV. 19. 20.

Variat

1. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

## 136 GENERA MORBORUM

Morbilli anomali, *Sydenh. Sect. V. cap. 3.*

### 2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays, Vol. V.*  
art. 2.

### 3. Comitante diathesi putrida, Clar. *Watson,* *Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.*

## II. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3. \*.

Scotis the NIRLES.

## G. XXIX. SCARLATINA.

### Synocha contagiosa.

\* SAUVAGESIUM fecutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catarrhalibus, rubeolae adeo propriis.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294. Junck. 75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. VI. cap. 2.  
Soc. Royale I. Mem. p. 10. Mach. p. 380.

II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa\*.

\* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam



Scarlatina anginosa, S. sp. 6. *Withering* on the scarlet fever.

Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque aegris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando fati exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus aegris simplicem esse viderim, saepe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, et semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter Phlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus SYDENHAMO perspicacissimo et aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, et datur, itaque contagio quaedam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc absque affectione quadam cynanchica, gignens. Quod, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens, quae plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil praeterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istae ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis et primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinae et cynanchis malignae contagionem semper inesse puto.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh.  
 Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolosa,  
 S. sp. 5. nobis non liquet.

G. XXX. P E S T I S.

Typhus maxime contagiosa, cum summa  
 debilitate \*.

In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot aëgotantium sine cynanche quacunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, haec benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentia, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et haec fere semper ulcera maligna, foeda, serpentia, gangraenosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

\* De charactere pestis, lites inter medicos saepe ortae sunt, nec facile dirimendae, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junc.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis *Class.*

3. *Traité de la peste*, pag. 41. Ejusdem pestis, Cl. 5ta, *Traité*, p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2.

*Traité*, p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, *Traité*,

p. 225. &c. *Waldschmidt.* de peste Holsatica,

apud *Halleri*, *Diff. pract.* tom. V. *Chenot.* de

peste Transylvanica 1755, 1759. *De Haen*, *Rat.*

med. Pars xiv. *Car.* de Mertens de peste Mos-

couense 1771. *Samoilowitz* *Memoire* sur la

peste de Moscou 1771. Ejusd. lettre sur l'ex-

periences des frictions glaciales pour la guerison

de la peste. Ejusd. mem. sur l'inoculation de la

peste. *Unterricht vors volk gegen die pest.*

*Dantzic* 1770. *Muratori* *Del Governo della*

peste. *Brescia* 1721.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med.

Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Maffil. Cl. 1. Traité,  
p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

## G. XXXI. ERYSIPELAS\*.

Synocha duorum vel trium dierum, ple-  
rumque cum somnolentia, saepe cum  
delirio.

\* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate,  
tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis u-  
surpatur, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum;  
quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junc-  
tam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum  
febris illa exanthematica, quam erythema sequitur,  
vocari velit.

Minus recte forsitan Ill. LINNÆUS erysipelas pro  
protypo exanthematicorum habuit; inter exanthe-  
mata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas du-  
bitari potest.

## 142 GENERA MORBORUM

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10. Sag. G. 296.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

Febris erysipelatosa. Macb. p. 382.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythemate, rubedine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II. c. 15.

Febris erysipelatosa, Sydenham, sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2. \*.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5. †.

\* Haec non nisi varietas erysipelatis vesiculosi, gradu solum differens, esse videtur.

† Haec et sequens non nisi febres cum erythemate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas saepe aliquid putridae et gangraenosae indolis prae se ferre; nec dubito quin erysipelas, quod  
in

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctænodes* \*) erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus, et protinus in phlyctænas, five vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, *Russel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Zona ignea, *Hoffm.* app. tom. III. p. 426.

Herpes Zoster, S. sp. 9.

### Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

in hac regione, plerumque diatthesi phlogistica comitatur, aliquando, praesertim in regionibus calidioribus, cum diatthesi putrida adfit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissimus; sed de posteriori nobis non fatis constat.

\* An haec species ad idem cum erysipelate vesiculoso genus recte referatur, dubito; sed judicent periti.

Caeterae SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

### G. XXXII. MILIARIA\*.

\* Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatim quaeritur. Quod nunquam idiopathicus sit, praeter opinionem medicorum, a medio seculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, et contra sententiam medicorum hujus aevi quorundam spectabilium, affirmare non auserim; sed cum experientiam in hac re saepe fallacem, et medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor; et, utcumque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiores, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammatoriis tum putridis, aliquando adjungitur; in nullis tamen, nisi regimine calido et sudoribus praeceuntibus, ortum, et in pluribus, regimine temperato, et sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagio-

num

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio,  
fudore olido, et punctiōibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretæ, per totam cutem, præter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

num specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed sæpius in vitæ decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiae natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum et peritissimum CAROLUM WHITE habere mihi gratulor. Vide *White on the Management of Lying-in Women*.

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibufvis hanc rem certius dijudicandam relinquens.



## 146 GENERA MORBORUM

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. *Sag.* G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.*  
II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

Germanis der FRIESEL. *God. Welsch. Hist.*  
med. de novo puerperarum morbo, qui der  
FRIESEL dicitur, *Lipf.* 1655.

### De hoc morbo scriptores praecipui sunt.

*Hamilton*, de febr. miliar. 1710. *Fantonus*, de febr.  
mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce*, de  
febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767.  
*De Haen*, de divis febr. 1760, et in *Ratio med.*  
passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.  
*Baraillon* sur la fièvre miliaire, *Soc. Royale I.*  
*Mem.* p. 193. *ibid.* II. *Hist.* p. 198.  
*Gastellier* sur la fièvre miliaire des femmes en  
coucher *Montargis* 1779. *Varnier* sur la fièvre  
miliaire de Normandie, *Soc. Royale III.* *Mem.*  
p. 281.

### Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent,

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. 5.

### Symptomaticae manifesto sunt,

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris nova febris, *Sydenh.* Sched. monit. S. sp. d.

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. l.

Miliaris critica, S. sp. b.

### G. XXXIII. URTICARIA\*.

#### Febris amphemerina †.

\* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HEBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et qualem saepius ipsi vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

## 148 GENERA MORBORUM

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeunt\*.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junc.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.

Febris scarlatina, et febris urticata, *Meyferey*,  
Mal. des armées, 291. et seq.

### G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

\* Ad aliorum potius quam meipsum mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

Pemphigus, S. G. 93. *Sag.* 291.

Morta, L. I.

Febris bullosa, V. 41.

Species ex SAUVAGESIO sunt \*,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata ferosa, C. *Pison.* obs. 150.

\* Cum pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum inveni-  
nerim; quae in Notologia nostra de eo dicenda essent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depro-  
menda erant. Eum itaque secutus sum; sed haec morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi videntur. Quae ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere fas est; quae autem ex CHRISTOPHORI SELIGERI, tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, parum attentione digna mihi videntur. Quae porro ex D. THIERRY relatione adducuntur meam fidem omnino superant: Nimirum, *quod in morbo admodum exitiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis commissus, mortem evadebat.* Denique, de morbo admodum ambiguo a D. LANGHANS, in Actis Helveticis descripto,

## 150 GENERA MORBORUM

Febris pemphygodes, *Ephem. Germ. D. I. A. VIII.*  
obf. 56.

Pemphigus castrensis, *S. sp. 2.*

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et col-  
lum sparsis, *Morton. app. ad exerc. II.*

Pemphigus Helveticus, *S. sp. 3. Langhaus in Act.*  
*Helvet. vol. 2. p. 260. et in Beschreibung des Sie-*  
*menthals, Zurich 1753.*

Febris Vesicatoria, *Macb. p. 389.*

De pemphigo Indico, *S. sp. 4. et*

Pemphigo Brasiliensi, *S. sp. 5. non liquet.*

### G. XXXV. A P H T H A.

descripto, donec aliae observationes rem elucidaverint,  
nihil concludere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam  
cynanche maligna fuit ille morbus, et, ad summum,  
quod pemphigus omnis morbus symptomaticus sit,  
fatis verisimile videtur. Paulo postquam haec impres-  
sa sunt, Collega noster eximius Franciscus Home  
mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui pri-  
mum in brachiis, et successive demum in toto corpore,  
vesiculae magnitudinis avellanae obortae sunt, et post  
duos tresve dies effuso humoris serosi pauxillo col-  
lapsae sunt. Haec febris autem nullam indolem vel  
typum peculiarem monstrabat et cito disparuit nequa-  
quam contagiosa.

Synochus \*.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpurascens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrafacito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Sag.* 298. *Boerb.* 978.

*Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Aphtha *infantum*.

\* An aphtha inter exanthemata recensenda sit, dubito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi sine febre fuit; et si quando cum aphtha infantum febris adfuit, haec fere semper aphthae supervenerat. Aphtha adultorum quidem saepe febre supervenit. Sed, febribus diversarum specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris quaevis aphthae propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.

## 152 GENERA MORBORUM

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Symptomatica videntur,

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticae sunt

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est,

PURPURA, S. G. 96. *Sag.* G. 292. \*.

Petechia, L. 5.

\* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematis et profluviis, modo in iis morbis sit quaedam ad putredinem proclivitas, appareant petechiae; has pro efflorescentia symptomatica, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

## O. IV. HÆMORRHAGIÆ\*.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque  
vi externa; sanguis missus ut in phleg-  
masiis apparet.

Haemorrhagiæ, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.

*Junk.* 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. *Sag.* Cl. V. O. I.

\* Classẽ Fluxuum apud SAUVAGESIUM et SA-  
GARUM, vel Profluviorum apud VOGELIUM, vel  
morborum evacuatoriorum apud LINNÆUM, cum  
illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimi-  
les conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde  
idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam e-  
jusmodi classẽ admittere nolui, et morbos in ea re-  
censitos aliorum referendos esse censui. Illi quos  
pyrexia quaedam semper comitatur, sub classẽ Py-  
rexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur he-  
morrhagias



## G. XXXVI. EPISTAXIS\*.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor;  
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

morrhagias *activas* quas vocant posui. HOFFMAN-  
NUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi hae-  
morrhagiis tractavit, et in praefatione rationem red-  
didit; quod, scilicet, “*probe consideratis phaenomenis,  
et paulo pensiculatiis subductis rationibus, sanguinis erup-  
tiones iisdem propemodum, utut, non satis completis mo-  
tibus quibus febres oriuntur, progignuntur.*”

\* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philo-  
sophia Botanica, No. 233. monuit LINNÆUS, “*No-  
mina generica, cum classium et ordinum naturalium no-  
menclaturis communis, omittenda esse.*” Contra hanc  
regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo haemor-  
rhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione satis  
frequenter usitata, pro nomine generico utatur. Nec  
quidem, cum erraverit, ipse HIPPOCRATES imitan-  
dus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum e-  
rat, et a VOGELIO quod hic usurpatum est de-  
sumpsi.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173. *Sag.* G. 174.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

## I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

Variat ratione aetatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethorae  
arteriosae.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethorae  
venosae.

## II. Symptomaticae.

### 1. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* *ibid.*

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

### 3. A causis externis.

## 156 GENERA MORBORUM

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

### G. XXXVII. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor ; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus ; dyspnoea ; titillatio faucium ; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. Sag.

G. 175. *Junc.* 8.

Haemoptoe, *Boerb.* 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

Species idiopathicae sunt,

1. Haemoptysis (*plethorica*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. Haemoptysis (*violenta*) a vi externa applicata.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

3. Haemoptysis (*phthifica*) post tussim cum macie et debilitate diuturnam.

Haemoptysis phthifica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptoe, Lond. Med. Obs. IV. 16. 18.

4. Haemoptysis (*calculosa*) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calculis.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

5. Haemoptysis (*vicaria*) post evacuationis solitae suppressionem.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticae sunt,

Haemoptysis *pneumonica*.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica, *Laelii a fonte*.

Haemoptysis *exanthematica*.

## 158 GENERA MORBORUM

*Haemoptysis variolosa*, S. sp. 7.

*Haemoptysis rubeolosa*.

*Haemoptysis hydropica*,

*Haemoptysis ascitica*, S. sp. 15.

*Haemoptysis hydrothoracica*

*Haemoptysis cachectica*.

*Haemoptysis splenetica*, S. sp. 16.

Ineptae et spuriae sunt,

*Haemoptysis a diapedesi*, S. sp. 3.

*Haemoptysis a sphacelo pulmonum*, S. sp. 11.

*Haemoptysis scorbutica*, S. sp. 6.

*Haemoptysis Helvigiana*, S. sp. 17.

*Haemoptysis a hirudine*, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela est

P H T H I S I S.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,  
febre hectica, et plerumque expectora-  
tione purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 310. Sag. 101.  
*Junc.* 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthifica, five tabes pulmonalis, *Hoffm.*

III. 284. Lond. Med. Obs. IV. 18. 23. V. 33.

Simmons on consumptions 1780.

Species sunt,

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. cap. 3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthisis confirmata *Auctorum.*

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

Ratione causae remotae.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

## 160 GENERA MORBORUM

Phthisis a febris, S. sp. 13.

Phthisis rheumatico-arthritis, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15: *Schacht.* de phthisi  
icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

### Variat ratione fontis purulentæ.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen*, Rat. mē-  
dendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid. \*.

## G. XXXVIII. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lum-

\* Utrum, de hoc fonte puris, recte an fecus judi-  
caverit HÆNIUS, hujusmodi species vix in Nosologia  
locum habere potest, cum a signis quibusvis externis  
dignosci non queat.

borum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192. Sag. G. 182.  
*Macb.* p. 481.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.

Haemorrhoides, *Junck.* 11. et 12.

Leucorrhoids, V. 112.

Proctalgia haemorrhoidalis, *Macb.* p. 540.

Species sunt,

1. Haemorrhoids (*tumens*) externa a mariscis,

Marisca, S. G. 35. Sag. G. 37.

Variat,

A. Cruenta.

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.

Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

VOL. II.

X



Haemorrhoides excedentes, *Alberti* de haemorrhoid. pag. 179.

Haemorrhoids polyposa, *S.* sp. 3.

## B. Mucosa,

Haemorrhoides decoloratae, albae, et mucidae, *Junck.* 13. *Alberti*, pag. 248.

Proctalgia intertriginosa, *Macb.* p. 541.

### 2. Haemorrhoids (*procidens*) externa a procidentia ani.

Haemorrhoids ab exania, *S.* sp. 4. *Med. Eff. Liter.* et *Phyf.* II. 27. *Morg.* de caus. Ep. XXXIII.

### 3. Haemorrhoids (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani \*.

\* STAHLIUS, et ejus sequaces, distinxerunt haemorrhoides in internas, quae sanguinem ex ramis venae portarum, et externas, quae sanguinem ex ramis venae cavae profundunt; sed, quantum video, scaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid ad distinguendam morbi naturam, vel effectum, conferre posset; nam arteriae et venae, ad inferiorem intestini recti partem pertinentes,

4. Haemorrhoids (*caeca*) cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.

Haemorrhoides caecae, *Junck.* 12. *Alberti*, pag 274. \*.

Proctalgia inflammatoria, *Mach.* p. 540.

## G. XXXIX. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior,

pertinentes, ortu utcunque diversae, tam frequenter inter se invicem communicantur et conjungantur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, et utriusvis effectus fere idem semper esse oporteat. Non ideo haemorrhoidem internam et externam ad mentem Stahlianorum distinxi, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

\* Haemorrhoids saepe corporis universi morbus est, five a quodam universi corporis statu pendens; sed saepe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam haemorrhoids quaevis, etiamsi initio mere localis sit, si saepius, ut solet, redierit, tandem, sicut haemorrhagia alia quaevis saepe rediens, necessario fit universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, et haemorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales recensendam esse censui.

vel fanguinis e vagina praeter ordinem  
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia, Sag. G. 179.

Uteri haemorrhagia, Hoffm. II. 224.

Haemorrhagia uterina, Junck. 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. Sag.  
G. 202.

Cachexia uterina, five fluor albus, Hoffm. III.  
348.

Fluor albus, Junck. 133. \*.

Abortus, S. G. 245. L. 204. Sag. G. 180. Junck. 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini fanguinis, Boerb. 1303.

Convulsio uteri, five abortus, Hoffm. III. 176.

\* Leucorrhoeam, five fluorem album, auctorum  
hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhoeam  
sine vitio locali omnem huc omnino referendam esse  
censeo. Plerumque enim, et fere semper, leucor-  
rhoea vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam  
innox secuta, et a temporibus quando apparet leucor-  
rhoea serum sub hac effusum ab iisdem vasis, quae  
menses profundunt, provenire, et saepe leucorrhoeam  
ab

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff.  
sopra i mestrui.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intorno al flusso di sangue dall utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, satis verisimile est.

## 166 GENERA MORBORUM

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pagla* diff. supra  
citat.

### 4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex vitio locali,

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

### 5. Menorrhagia (*alba*) ferosa sine vitio locali in non gravidis \*.

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

### 6. Menorrhagia (*Nabothi*) ferosa in gra- vidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

\* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod  
ad clariss. medici Pariensis RAULIN, de fluore albo  
librum,

Menorrhagiam ferofam, five leucorrhoeam  
ex vitio locali, ad morbos locales refe-  
rendam effe cenfeo.

Haemorrhagiae fequentes plerumque, fi  
non femper, fymptomaticae funt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. *Sag.*  
G. 176.

Vel fcorbuti, vel vitii oris, vel injuriae  
externae, fymptoma eft. Cum autem

librum, *Traité des fleurs blanches*, neque ftudiofos re-  
legaverim, neque fpecies fluoris albi varias ab illuftri  
auctore indicatas ipfe recensuerim. Recte an fecus  
fecerim, peritis dijudicandum relinquo; fed quod  
non fecerim hacc caufa fuit. Plura in libro illo in-  
geniofo fubtilius, quam verius dicta, mihi videntur;  
et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter uteri  
partium affectione oriri poffit, non intelligo, vel quod  
revera oriantur, ex meis faltem obfervationibus, for-  
fan paucioribus, mihi nequaquam conftat. Lectores  
itaque nostros potius ad auctorem ipfum relegare,  
quam doctrinam ejus male intellectam, et forfan mi-  
nus recte traditam, hic exhibere velim.

species SAUVAGESII fere omnes recensere idoneum duco nunc sequenti serie recensitas velim.

**Haematemesis plethorica**, S. sp. 1.

catamenialis, S. sp. 5.

haemorrhoidalis,

ex splene, S. sp. 7.

ex hepate, S. sp. 13.

ex pancreate, S. sp. 6.

**Haematemesis atra**, S. sp. 12.

scorbutica, S. sp. 8.

ex aneurismate, S. sp. 2.

carnosis cruenta, S. sp. 11.

traumatica, S. sp. 3.

ab hirudine, S. sp. 4.

cholericæ, S. sp. 9.

a veneno, S. sp. 14.

Simulata, S. sp. 10.

**Apud SAUVAGESIUM species sunt,**

1. Stomacæ scorbutica.

2. Stomacæ universalis.

3. Stomacace ab haemorrhoo.
4. Stomacace purulenta.

HÆMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89.  
G. 177.

Plerumque haemorrhagiae solitae vicaria est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi nigri, vel denique vis externae, symptomata est.

1. Haematemesis plethorica.
2. Haematemesis ex aneurismate.
3. Haematemesis traumatica.
4. Haematemesis ab hirudine.
5. Haematemesis catamenialis.
6. Haematemesis ex pancreate.
7. Haematemesis ex splene.
8. Haematemesis scorbutica.
9. Haematemesis cholericæ.
10. Haematemesis simulata.
11. Haematemesis carnosæ cruentæ.
12. Haematemesis atra.
13. Haematemesis ab hepate.
14. Haematemesis a veneno.



## 170 GENERA MORBORUM

HÆMATURIA, S. G. 243. L. 198. V. 92. *Sag.*  
G. 178.

Edinb. Eff. V. 72.

Plerumque calculi renalis, aliquando fe-  
brium putridarum symptomata est.

Species secundum SAUVAGESIUM sunt.

Haematuria spontanea, S. sp. 1.  
catamenialis, S. sp. 12.

calculosa, S. sp. 5.  
nigra, S. sp. 11.  
purulenta, S. sp. 4.

violenta, S. sp. 2.  
traumatica, S. sp. 14.  
haemorrhoidalis, S. sp. 9.  
ejaculatoria, S. sp. 7.

Haematuria stillatitia, S. sp. 8.

in exanthematicis, S. sp. 6

Spuria, S. sp. 10.  
deceptiva, S. sp. 3.  
a transfusione, S. sp. 13.  
a verme, S. sp. 15.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius  
morbi vesicae, symptomata.

O. V. PROFLUVIA\*.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.

Profluvia, V. CL. II.

G. XL. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag.* G. 145.

Coryza, L. 174. V. 100. *Sag.* G. 196.

\* Ob eandem rationem qua haemorrhagias, profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathesi phlogistica, phlegmasiis maxime affinis est; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibusvis differt.

Rheuma, S. G. 149. *Sag.* G. 255.

Tussis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 249.  
*Junck.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

Genera frequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomata sunt.

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obs.  
cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de sed.  
XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud  
*Haller*, disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Febris remittens catarrhalis, *Mach.* p. 359.

## 174 GENERA MORBORUM

Amphimerina tufficulosa, S. sp. 13.?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

### Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

### Hujus exempla sunt.

Anno 1323. Cronica meteorologica della Toscana,  
apud *Targioni Tozzetti* Osservaz.  
Med. Raccolta I. pag. 175.

1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

*Valefcus de Taranta* apud *Morgagn.*  
de fedibus XIII. 4.

*Marchesi* ibid.

1510. *Valleriola* append. ad loc. com. cap. 2.

1575. *Valleriola*, ibid.

*Riverii* Obf. in biblioth. vet. repert.  
obf. IX.

*Foresti*, L. VI. obf. 1.

1580. *Haenischius* in *Aretaeum*, pag. 315.  
396.

*Wieri*, Obf. L. II.

Anno 1580. *P. Sal. Diversus*, de febre pestilenti,  
cap. XI.

*Foreflus*, L. VI. obf. 3.

*Rivcrii* Obf. in biblioth. vet. repert.  
obf. X.

*Sennertus* de febre, L. IV. cap. 17.

1591. *Sennertus*, ibid.

*Pechlin*, L. II. Obf. 17.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.

*Raygerus* in *Ephem. Germ. D. I. A.*  
VI. et VII. obf. 213.

*P. de Serbait.*

1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady*.

*Zod. mcd. Gall. A. I. Decemb.* obf. 6.

1708. *Schroeckius* in *Ephem. Germ. Cent. I.*  
et II. in append. pag. 14.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in *Ephem. Germ. Cent.*  
III. et IV. obf. 58.

*Sbroeckius*, ibid. in append. pag. 26.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

*C. Fr. Loew.* in append. ad *A. N. C.*  
vol. III.

*Scheuchzer*, Obf. meteorol. in app. ad  
*A. N. C.* vol. IV.

*Morgagni* de sed. et caus. XIII. 3. 4.

## 176 GENERA MORBORUM

Anno 1729 et 1730. *Beccarius*, A. N. C. III. obf.  
48. pag. 142.

*Hillary* on weather and difeafes, pag.  
35.

*Winteringham*, Comm. Nofolog. pag.  
319.

*Rutty's* hift. of weather, pag. 17.

*Perkin's* Soc. Royale I. Hift. p. 209.

1732 et 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733.  
pag. 6. 52. 108. 267.

*Detharding* de febr. Eyderoftad. apud

*Halleri* difputat. pract. vol. V.

*Edin. Med. Eff.* vol. II. art. 2.

*Hillary* of weather, &c. pag. 47.

*Winteringbau*, Comm. Nofolog. p. 354.

*Huxham* de aëre, &c. 1733. M. Febr.

*Rutty's* hift. of weather, pag. 30.

1737. Jan. *Rutty*, ibid. pag. 60.

Octob. *Rutty*, ibid. pag. 60.

Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737, pag.  
347.

1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag.  
106. 188. 313. 336.

*Fuch* et *Zuberbuhler* de febre catarrhali, apud *Hallër*. Disp. pract. tom. V.

*Huxham* de aëre, 1743. M. April.

*Rutty*, hift. of weather, p. 99.

Anno 1742. 1743. *Targioni Tozzetti*. Racolt. I. di  
 offervaz. Med. pag. 176.

1748. *Cleghorn*, Minorca, pag. 132.

*Perkin's* Soc. Royale I. Hist. p. 210.  
 et suivans.

1758. *Rutty*, hist. of weather, pag. 211.

*Whytt*, Lond. Med. Obs. vol. II. art. 13.

1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.

*Monro*, Dis. of mil. hosp. pag. 137.

*Mach*. p. 333.

1767. *Heberden*, Med. transact. I. art. 18.

*Mach*. p. 334.

1775. Lond. Med. Obs. VI. 30.

1779. et 1780. Soc. Royale III. Mem.  
 p. 16.

Saillant Tableau des Epidemies ca-  
 tarrhales 1780.

Inter catarrhi, coryzae, et tussis species apud  
 SAUVAGESIUM, symptomatice sunt,

Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolosa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.



## 178 GENERA MORBORUM

Tussis accidentalis, S. sp. 4.  
Tussis gutturalis, S. sp. 8.  
Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.  
Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis ficca, S. sp. 3.  
Tussis calculosa, S. sp. 22.  
Tussis phthifica, S. sp. 17.  
Tussis haemoptoica, S. sp. 15.  
Tussis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.  
Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.  
Tussis stomachalis ficca, S. sp. 7.  
Tussis hysterica, S. sp. 2.  
Tussis gravidarum, S. sp. 14.  
Tussis hepatica, S. sp. 9.  
Tussis rheumatica, S. sp. 18.  
Tussis arthritica, S. sp. 19.  
Tussis metallicolarum, S. sp. 4.

## XLI. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa ; dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, re-tentis plerumque foecibus alvinis ; tormina ; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Sag.* 183.  
*Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

Non nisi speciem unicam novi cujus nomina apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham*, sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Ncomagenfi 1736. *Huxham*, de aëre, &c. ad ann. 1743. *Clegborn's* Minorca, chap. 5. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark*, Hist. et sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr. Zurich. 1767. Soc. Royale III. Mem. p. 32.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illust. *Pringle*, Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro*, Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Variat,

1. Vermibus comitata.

## 180 GENERA MORBORUM

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aëre, &c. ad ann. 1743. *M. Maio*. Ill. *Pringle*, pag. 225. *Monro*, pag. 62.

### 2. Rejēctis moleculis carnofis, vel sebaceis,

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius* *Ephem.* Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner*, ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroëckii*. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 17—24. Ill. *Pringle*, pag. 237. *Monro*, pag. 62.

### 3. Febre intermittente comitata.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* *Minorca*, pag. 236. *Lautter.* hist. med. bienn. cas. 17. 20.

### 4. Sine fanguine.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis*, *Pharm.* rat. P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham*, *Ed. Leid.* pag. 179. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro*, pag. 61. *Roederer* de morbo mucoso, *Gotting.* 1762.

5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. sp. 2. Febris ex-  
anthematico-dysenterica Tiguri epidemica, 1747.

Symptomaticae sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.

Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.

Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.

Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.

Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria mesenterii vomica, S. sp. 11.

Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a cathartica, S. sp. 12.

## CL. II. NEUROSES\*.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

\* A tempore celebris quondam apud Anglos medici THOMÆ WILLIS, morbos quosdam ab aliis quibuscvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morborum fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub nomine Neurosium recte instituisse mihi videor,

## O. I. C O M A T A.

Motus voluntarii imminuti cum sopore five  
sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

## G. XLII. A P O P L E X I A.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum  
sopore\*, plus minus profundo, superstitite  
motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.*

1007. *Junck.* 117. *Sag.* G. 288. *Wepfer.* hist.  
apoplecticorum.

\* Apud LINNÆUM vocabulum Sopor, tam pro  
motuum, quam pro sensuum feriatiōe ponitur; sed  
sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu som-  
no simili, eodem utimur.

## 184 GENERA MORBORUM

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.

*Sag.* G. 287. *Mach.* p. 561 \*.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.*

1048. *Sag.* G. 286.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

### Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G.

281. *Boerb.* 1036. *Junck.* 44.

• Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, *Hoffm.* III.

44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. *Sag.* G. 283.

### Symptomata esse videntur,

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. *Sag.* G.

284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22. *Sag.* G.

285.

\* Cum genera *carus*, &c. hic subjuncta non nisi a-  
poplexiae leviores esse videntur, nec vel respiratione  
vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad u-  
num genus omnia referenda esse censui.

Apoplexiae idiopathicae species sunt,

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. *Morgagn.* de causis, &c. II. III. LX. *Preysinger*, sp. 1.

Carus spontaneus, S. sp. 2. *Boerb.* 1045.

Asphyxia \* spinalis, *Du Hamel*, Hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. *Boerb.* Praelect. ad Instit. 401.

*Morgagn.* de causis, &c. III. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

\* Genus *asphyxiae* ad *syncopen* olim retuli, et ejusdem species quasdam non nisi gradu a *syncope* differre, adhuc censeo. Plures vero *asphyxiae* species ad *apoplexiae* genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. *Asphyxia* spinalis quidem hic apponita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter *apoplexiae* species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his satis perspectis plures *asphyxiae* species a SAUVAGESIO recensitas inter *apoplexiae* species.



## 186 GENERA MORBORUM

### 2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque senum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, *Preysinger*, Sp. 4. *Morg.* de causis, &c. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolenta, S. sp. 1.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in aph. 1010. 2 γ. et 3 α.

species enumeravi; nec huic ob stare velim quod, in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstita, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; et si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conicere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

3. Apoplexia (*hydrocephalica*\*) paulatim adoriens; infantes et impuberes, primum lassitudine, febricula et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whytt's Works*, pag. 725.

*Lond. Med. Observ.* Vol. IV. art. 3. 6. and 25.

VI. 6. 7. 8. *Gaudelius* de hydrocephalo, apud

*Sandifort* Thesaur. Vol. II. Ed. Med. Eff. II. 18.

III. 23. Soc. Royale III. Mem. p. 194.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, Diff. de hydrocephalo, Edinb. 1779.

Asthenia a hydrocephalo, S. sp. 3.

\* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.

## 188 GENERA MORBORUM

### 4. Apoplexia (*atrabiliaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabiliaria, S. fp. 12. *Preysinger*, Sp. 6.

Carus traumaticus, S. fp. 5.

### 5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. fp. 2. Ed. Eff. V. 52.

### 6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis fedantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. fp. 3.

Carus a narcoticis, S. fp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. fp. 3.

Carus a plumbagine, S. fp. 10.

Apoplexia mephitica, S. fp. 14. Ed. Eff. V. 55.

Asphyxia a mephitide, S. fp. 9.

Asphyxia a musto, S. fp. 3.

Catalepsis a fumo, S. fp. 3.

Asphyxia a fumis, S. fp. 2.

Asphyxia a carbone, S. fp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. fp. 11.

Asphyxia fideratorum, S. sp. 10.

Carus ab infolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica*\*) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

\* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepe prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiūquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiae species collocavi.

## 190 GENERA MORBORUM

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G.  
281. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.

**Species apud SAUVAGESIUM sunt,**

Catalepsis hysterica, S. sp. 1.  
———— verminosa, S. sp. 2.  
———— a fumo, S. sp. 3.  
———— a menostasia, S. sp. 4.  
———— melancholica, S. sp. 5.  
———— delirans, S. sp. 6.

### 9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.

Asphyxia suspenforum, S. sp. 4.  
Asphyxia immerforum, S. sp. 1. *M<sup>r</sup> Donel* de submerfis, Edin. 1784.

Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiae genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

**Apoplexia saepe symptomatica est,**

#### 1. Febris intermittens.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.  
Carus febricosus, S. sp. 3.

Cataphora timor, S. sp. 8.  
 Typhomania febricosa, S. sp. 1.  
 Catalepsis quartanaria, S. sp. 7

## 2. Febris continuæ.

Carus febrilis, S. sp. 2.  
 Typhomania continua, S. sp. 2.  
 Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.  
 Lethargus a febre, S. sp. 1.

## 3. Phlegmasiæ.

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13.  
 Lethargus cephaliticus, S. sp. 4.  
 Lethargus pulmonicus, S. sp. 2.

## 4. Exanthematis.

Carus variolosus, S. sp. 8.  
 Apoplexia metastatica, S. sp. 6.  
 Carus exanthematicus, S. sp. 18.  
 Cataphora exanthematica, S. sp. 5.

## 5. Hysteriæ.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4.

## 192 GENERA MORBORUM

*Carus hystericus*, S. sp. 9.

*Asphyxia hystERICA*, S. sp. 8.

*Carus myftagnus*, S. sp. 17.

*Carus hypochondriacus*, S. sp. 13.

### 6. Epilepsiae.

*Apoplexia epileptica*, S. sp. 8.

*Apoplexia fufpiriofa*, S. sp. 10.

### 7. Podagrae.

*Apoplexia arthritica*, S. sp. 5.

*Carus arthriticus*, S. sp. 6.

*Cataphora arthritica*, S. sp. 4.

*Lethargus arthriticus*, S. sp. 5.

### 8. Vermium.

*Apoplexia verminofa*, S. sp. 15.

*Carus verminofus*, S. sp. 7.

*Typhomania verminofa*, S. sp. 4.

### 9. Ifchuriae.

*Carus Ifchuriofus*, S. sp. 4.

10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

G. XLIII. P A R A L Y S I S.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-  
nuti, faepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerb.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

I. Species idiopathicae sunt,

1. Paralyfis (*partialis*) quorundam mus-  
culorum tantum.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paralyfis serosa, S. sp. 12.

Paralyfis nervea, S. sp. 11.



## 194 GENERA MORBORUM

Mutitas a gloffolyfi, S. fp. 1.

Aphonia paralytica, S. fp. 8.

### 2. Paralyfis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris. .

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. *Sag.*  
G. 276.

Variat ratione habitus corporis.

#### a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. fp. 7.

Hemiplegia fpasmodica, S. fp. 2.

#### b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. fp. 10.

Male recensetur

Hemiplegia apoftematodes, S. fp. 11.

Quae signis externis dignosci non potest, et

Hemiplegia ex epilepsia, S. fp. 12.

Recenseri vix meretur.

3. Paralyfis (*paraplegica*) dimidii corporis  
transversim sumpti.

Paraplexia, S. G. 171. Sag. G. 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia fanguinea, S. sp. 2.

Paraplexia a spina bifida, S. sp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. sp. 1.

4. Paralyfis (*venenata*) a potentiis fedan-  
tibus externe vel interne adhibitis.

Paralyfis metallariorum, S. sp. 22.

Hemiplegia faturnina, S. sp. 14.

II. Species fymptomaticae funt,

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8.

Paraplegia intermittens, S. sp. 6.

Paralyfis febrilis, S. sp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. sp. 6.

Paralyfis rheumatica, S. sp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. sp. 5.

Paralyfis rachialgica, S. sp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. sp. 5.

Paralyfis biliofa, S. sp. 9.

## 196 GENERA MORBORUM

Hemiplegia transversa, S. sp. 1.  
Paralyfis scorbutica, S. sp. 6.  
Paralyfis scrophulosa, S. sp. 5.  
Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.  
Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.  
Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.  
Paralyfis Polonica, S. sp. 7.

Paralyfis a vomica, S. sp. 10.

Paralyfis traumatica, S. sp. 4.  
Hemiplegia traumatica, S. sp. 9.  
Paraplegia traumatica, S. sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum,  
in numerum generum recipere nollem;  
species autem a SAUVAGESIO recensitas,  
prout mihi vel Astheniae vel Paralyfios,  
vel convulsionis symptomata esse videntur,  
hic subjungam.

### T R E M O R.

Artus alterna per itus et reditus frequentes  
motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. Sag. 236.

1. Species asthenicae,

- Tremor a debilitate, S. sp. 1.
- Tremor fenilis, S. sp. 2.
- Tremor a coffea, S. sp. 4.
- Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine,  
S. sp. 14.
- Tremor typhodes, S. sp. 19.

2. Species paralyticae.

- Tremor paralytodes, S. sp. 11.
- Tremor vertiginofus, S. sp. 7.
- Tremor a plethora, S. sp. 13.
- Tremor a faburra, S. sp. 12.
- Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.
- Tremor scorbuticus, S. sp. 10.
- Tremor rheumatismalis, S. sp. 18.
- Tremor temulentus, S. sp. 3.
- Tremor metallurgorum, S. sp. 5.
- Tremor traumaticus, S. sp. 17.

3. Species convulsivae.

- Tremor coactus, S. sp. 6.
- Tremor tendinum, S. sp. 9.
- Tremor palpitans, S. sp. 16.

## O. II. ADYNAMIÆ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales, imminuti.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychiae, S. Cl. VI. O. IV. *Sag.* Cl. IX.  
O. IV.

## G. XLIV. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. *Sag.* 280.  
*Junc.* 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. *Sag.*  
279.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. *Sag.* 281.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta saepe rediens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

Syncope plethorica, S. fp. 5. *Senac*, Tr. de coeur, p. 540.

Syncope a cardiogmo, S. fp. 7. *Senac*, de coeur, 414. *Morgagn.* de fed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. fp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. fp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber* Almag. L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. fp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Asphyxia Valfalviana, S. fp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. fp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. fp. 21.

Asphyxiae a pathemate, S. fp. 7.

Syncope ab antipathia, S. fp. 9. *Senac*, p. 554.

## 200 GENERA MORBORUM

Syncope a veneno, S. fp. 10. *Senac*, p. 546.

Syncope ab apostematis, S. fp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope a sphæcelo, S. fp. 14. *Senac*, p. 553.

Syncope ab inanitione, S. fp. 1. *Senac*, p. 536.

Syncope a phlebotomia, S. fp. 4.

Syncope a dolore, S. fp. 2. *Senac*, p. 583.

Asphyxia traumatica, S. fp. 14.

Asphyxia neophytorum, S. fp. 17.

### II. Symptomaticae, five symptomata morborum vel totius systematis, vel aliarum praeter cor partium.

Syncope febrilis, S. fp. 3. *Senac*, p. 548.

Syncope febricosa, S. fp. 17. *Torti Therap. spec.*  
L. III. cap. 1.

Syncope exanthematica, S. fp. 19.

Syncope metastatica, S. fp. 20.

Leipothymia stomachica, S. fp. 2.

Syncope stomachica, S. fp. 13. *Senac*, p. 545.

Syncope hysterica, S. fp. 6. *Senac*, p. 547.

Syncope arthritica, S. fp. 16. *Musgrave de arthr.*  
anomala, cap. 8.

Syncope scorbutica, S. fp. 15. *Lind Treat. on*  
scurvey.

P. II. chap. 11. *Senac*, p. 552.

## G. XLV. D Y S P E P S I A.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora faltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 277. Lond. Med. Obs. VI. 11.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. *Sag.* G. 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. *Sag.* G. 160.

Gastrodynia, S. G. 203. *Sag.* G. 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. *Sag.* G. 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. *Sag.* G. 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. *Sag.* G. 207.

## I. Idiopathicae.

Anorexia pituituosa, S. sp. 2.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

VOL. II. C c



## 202    GENERA MORBORUM

Anorexia exhaustorum, S. fp. 8.

Anorexia paralytica, S. fp. 1.

Nausea ex cacochylia, S. fp. 11.

Vomitus pituitosus, S. fp. 26.

Vomitus ruminatio, S. fp. 6.

Vomitus a faburra, S. fp. 2.

Vomitus a crapula, S. fp. 1.

Vomitus lacteus, S. fp. 3.

Flatulentia infantilis, S. fp. 5.

Flatulentia acida, S. fp. 1.

Flatulentia nidorosa, S. fp. 2.

Cardialgia bradypepta, S. fp. 9.

Cardialgia a faburra, S. fp. 2.

Cardialgia lactantium, S. fp. 11.

Cardialgia flatulenta, S. fp. 3.

Cardialgia paralytica, S. fp. 7.

Gastrodynia faburralis, S. fp. 1.

Gastrodynia flatulenta, S. fp. 2.

Gastrodynia periodynia, S. fp. 7.

Gastrodynia aftringens, S. fp. 9.

Gastrodynia atterens, S. fp. 10.

Gastrodynia a frigore, S. fp. 18.

## II. Symptomaticae,

## I. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia fchirrofa, S. fp. 6.

Vomitus a pyloro callofo, S. fp. 8.

Vomitus a fteatmate ventriculi, S. fp. 11.

Naufea ab apoftemate circa cardiam, S. fp. 9.

Gaftrodynia ulcerofa, S. fp. 5.

Vomitus ab ulcere ventriculi, S. fp. 10.

Cardialgia a veneno, S. fp. 2.

Gaftrodynia a veneno, S. fp. 4.

Vomitus a veneno, S. fp. 7.

Flatulentia accidentalis, S. fp. 4.

Gaftrodynia a peregrinis, S. fp. 11.

Anorexia biliofa, S. fp. 6.

Naufea biliofa, S. fp. 6.

Gaftrodynia biliofa, S. fp. 3.

Vomitus urinosus, S. fp. 27.

Gaftrodynia calculofa, S. fp. 8.

Vomitus bezoarticus, S. fp. 13.

Cardialgia verminofa, S. fp. 10.

Naufea a taenia, S. fp. 1.

Vomitus verminosus, S. fp. 5.

Gastrodynia a xiphoide, S. fp. 12.

Gastrodynia Americana, S. fp. 6.

Nausea ex compresso ventriculo, S. fp. 5.

Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. fp. 22.

Vomitus ab œsophago obstructo, S. fp. 21.

Gastrodynia gastrocelica, S. fp. 20.

Nausea ex gastrocele, S. fp. 4.

Vomitus gastrocelicus, S. fp. 18.

Cardialgia sputatoria, S. fp. 5.

Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13.

Nausea ex gastritide, S. fp. 10.

Vomitus gastriticus, S. fp. 19.

## 2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. fp. 23.

Vomitus a dentitione, S. fp. 4.

Vomitus iliacus, S. fp. 24.

Nausea ex pancreatis schirro, S. fp. 3.

Vomitus a pancreate, S. fp. 17.

Vomitus ab hepate obstructo, S. fp. 16.

Anorexia melancholica, S. fp. 5.

Gastrodynia hypochondriaca, S. fp. 16.

Flatulentia hypochondriaca, S. fp. 3.

- Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.  
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.  
 Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.  
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.  
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.  
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.  
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.  
 Nausea a femine corrupto, S. sp. 8.  
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.  
 Vomitus gravidarum, S. sp. 12.  
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.  
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.  
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.  
 Nausea nephritica, S. sp. 7.  
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.  
 Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.  
 Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.  
 Anorexia plethorica, S. sp. 3.  
 Anorexia cachectarum, S. sp. 7.  
 Anorexia febrilis, S. sp. 4.  
 Cardialgia febricosa, S. sp. 4.  
 Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.  
 Vomitus febricosus, S. sp. 29.  
 Vomitus rabiosus, S. sp. 14.  
 Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.  
 Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.  
 Nausea marina, S. sp. 12.

## 206 GENERA MORBORUM

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

### G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, molestia, et metu,  
ex causis non aequis, in temperamento  
melancholico.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218. *Sag.*  
332.

Morbus hypochondriacus, *Bacr.* 1098.

Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.*  
36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi  
non liquet.

Species sequentes ex FRÆCASSINO, ex  
theoria parum certa confictae, mihi  
videntur.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

Symptomaticae sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthifica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

## G. XLVII. C H L O R O S I S.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum\* retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Sag.* G. 135.

*Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.

\* In hoc charactere antea dixi menstruorum  
saepe retentio; quasi species chlorosis esset in qua  
mensēs

Chloroseos unicam speciem veram agnosci-  
mus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Caeterae SAUVAGESII species spuriae, sive  
decolorationes, symptomatae sunt.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

mensēs rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam  
cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito an spe-  
cies cachexiae quaevis sub titulo Chlorosis, vel sub  
charactere hic dato, recte poni possit; et nullam  
chlorosis speciem veram, praeter illam quae retentio-  
nem menstruorum comitatur, agnoscere vellem. Hinc  
vocabulum *saepe* in charactere nunc omissum est; sed  
simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus recte pro  
genere recensitam esse, cum pro symptomate amenor-  
rhoeae semper haberi possit.

*Chlorosis* ab hydrothorace, S. fp. 7.

*Chlorosis* maculosa, S. fp. 8.

*Chlorosis* Carthagenica, S. fp. 10.

*Chlorosis* Bengualensis, S. fp. 11.

*Chlorosis* rachialgica, S. fp. 12.

VOL. II.

D d



O. III. S P A S M I.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes \*.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. *Sag.* Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerb.* 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. T E T A N U S.

Plurium musculorum rigiditas spastica.

Variat gradu.

1. Tetanus.

Dimidium vel totum corpus spasmis affectum.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* G. 228.

\* Motus abnormes sunt qui ex causa praeternaturali oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturnitate

Catochus \*, S. G. 123. L. 128. V. 183. *Sag. G.*

229.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit SAUVAGESIUS; sed omnes, quae idiopathicae dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, et cujus forma praecipua apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus Indicus, S. sp. 5. de quo plura haberi possunt apud *Hillary*, Barbadoes, p. 219. *Chalmers*, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. *D.*

*Monro*,

tate contractionis praeter modum fiunt; et nullus dubito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

\* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species natura prorsus diversas; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quae a rigiditate spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

## 212 GENERA MORBORUM

*Monro*, Edinb. Phys. et Liter. Essays, Vol. III.  
Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. et sub nomine spasmi  
apud *Bontium* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Nec alius morbus est,

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Variat autem Tetanus ratione causae remotae, quatenus nimirum vel a causa interna, vel a frigore, vel a vulnere oriatur. A vulnere, varietas frequentissima apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

Variat etiam quavis causa ortus Tetanus ratione partis corporis affectae; hinc

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus holotonicus, S. sp. 4.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in Ephem. German. D. II. A. I. Obf. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Stork.* Ann. Med. 1758. *M. Julio.*

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Stork. Ann. Med.*  
759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus lateralis \*, S. sp. 6. *Morgagn. de caus.*  
et fed. X. 2. et 3.

Pleurosthotonos Strack.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

\* In exemplo Tetani lateralis quod profert SAUVAGESIUS, adfuit in eodem aegro alterius lateris paralyfis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui; sed si Tetani lateralis exemplum a MORGAGNIO allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenseri potuisset. Interim, donec haec res certius determinaretur, post Tetanum lateralem posui Pleurosthoton Strackii.

## 214 GENERA MORBORUM

### 2. Trismus. Praecipue maxillae inferioris Spastica rigiditas.

Trismus, S. G. 117. L. 124. Sag. G. 223.  
Capistrum, V. 208.

#### I. Species verae sunt,

##### 1. Trismus (*nascentium*) infantes intra duas primas a nativitate septimana corripiens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Gallis Americanis mal de mâchoire. *Heister*, Comp. med. pract. cap. XV. § 10. *Cleghorn's* Minorca, Introd. p. 33. *Hofer*. in Act. Helvet. tom. I. p. 65. *Mach*. P. 459.

##### 2. Trismus (*traumaticus*) omnium aetatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obj.* Vol. I. Art. I. 7. Vol. II. 8. 34. Vol. III. 31. Vol. IV. 7. VI. 13. *Med. Transf.* II. 4.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri* act. Helvet.  
tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's* Barbadoes,  
221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.

II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi  
species, spurias, vel falsas dicimus; vel  
quod non a spasmō, sed ab alio mus-  
culorum vitio pendeant, vel quod con-  
vulsivae potius quam spasmodicae sint,  
vel, denique, quod faciei potius quam  
maxillae inferioris, musculorum affec-  
tiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

## 216 GENERA MORBORUM

*Trismus cynicus*, S. sp. 16.

*Trismus cynogelos*, S. sp. 17.

*Trismus fardonicus*, S. sp. 18.

*Trismus diastrophe*, S. sp. 19.

### G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis,  
citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. *Sag.* G. 235.

#### I. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

#### II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

## G. LI. CHOREA\*.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, histrionum gesticationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. *Sag.* G. 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quae apud SAUVAGESIUM audit

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1.

Chorea St Viti *Sydenham.* Sched. monitoria.

\* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum autem ratione tum aetatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.



## 218 GENERA MORBORUM

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis,

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4

Hicaronosis *Mach.* 558.

### G. LII. R A P H A N I A.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.

Convulsivo raphania, S. sp. 7.

### Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst.* oper. tom. II. L. VIII. Obs. 22. *Willis* de Morb. convuls. *Muller* apud *Haller*, disp. tom. I. *Waltfchmied* apud *Haller*, disp. tom. VII. *Wedel*, ibid. *Hoffm.* tom. I. 231. *Kannigieffer*, A. N. C. tom. VII. *Brunner* in *Ephem. Germ.* D. III. A. II. obs. 224. *Willisch.* ibid. Cent. VII. obs. 13. *Wepfer* de affect. cap. obs. 120. *Breslauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. Vol. VII. Obs. 41. *Bruckmann.* Comm. Norimb, 1743, pag. 50.

Soc. Royale, I. Mem. p. 303. II. Mem. p.  
587.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An *Convulsio Soloniensis* vel *Necrosis ustilaginea* sit idem morbus ?

Vide *Salerne* in *Memoires* présentés a l'acad. des sciences, tom. II.

### G. LIII. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Sag. G.*  
24. *Boerh.* 1771. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.  
Lond. Med. Obs. VI. 9.

Eclampsia \*, S. G. 133. V. 189. *Sag. G.* 240.

\* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronico habent, distinguere, et pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS et VOGELIUS; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum eclampsia SAUVAGESII, tum causis tum phaenomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possum.

Species idiopathicae sunt,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel Scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica \*, S. sp. 2 ?

Epilepsia a terrore, *Mach.* p. 556.

2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa ma-

possim. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, et quae plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguendam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

\* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachectica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cachecticam* cum *serosa* HOFFMANNI et PISONIS eandem esse auctor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima, nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam cachecticam utroque loco posui, sed dubius, et aliis dijudicandum relinquens.

nifesta ; sed praegressa sensatione aurae  
cujusdam a parte corporis quadam ver-  
sus caput assurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

Epilepsia pedisymptomatica, S. sp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione  
manifesta oriens, et ablata irritatione  
cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, S. sp. 9.

A dolore.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10. Ed. Eff. V. 61.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

## 222    GENERA MORBORUM

### A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

### A veneno.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenanthæ, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

### A scabie, vel alia acris humoris effusione retropulsa.

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

### A cruditate ventriculi.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a faburra, S. sp. 5.

### A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

### Ab hæmorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

A debilitate.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Epilepsiae symptomatice sunt,

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 15.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

SECT. II. In functionibus vitalibus.

A. In actione cordis.

G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Sag*  
257. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33. *Mac.* 569.

Si palpitationis causae variae externis signis  
diagnosci possent, plures ejus species  
cum SAUVAGESIO pro diversitate cau-

fae statuere potuiffemus ; fed, cum caufae diverfae nullo modo, quantum novimus, diftingui queant, non nifi fpeciem unicam idiopathicam statuere poffum, et quam charactere fequenti infigniri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere conftans, faltem faepe rediens, fine alio morbo evidente.

Pro fynonymis fequentes SAUVAGESII fpecies recensere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. fp. 1. *Senac*,  
Mal. de coeur. p. 284. *Lancisi* de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. fp. 4. *Senac* de coeur, p.  
504.

Palpitatio apoftematofa, S. fp. 7. *Lancisi* de aneurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,  
485.

Palpitatio a corde offificato, S. fp. 2. *Senac* de  
coeur, pag. 484. *Morgagn.* de Sed. Ep. XXIV.  
17.

Palpitatio calculofa, S. fp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac* de coeur.  
lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polyposa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi* de  
aneurysf. prop. 53. *Senac*, 484.

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck*, Ann.  
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi* de a-  
neurysf. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck* Ann. med.  
I. p. 75.

B. In actione pulmonum,

G. LV. A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens ;  
cum angustiae in pectore sensu, et re-  
spiratione cum sibilo strepente ; tussis



## 226 GENERA MORBORUM

sub initio paroxyfmi difficilis, vel nulla,  
versus finem libera, cum fputo mucif  
faepe copiofo.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. *Sag.* G.  
252.

Asthma convulfivum et fpafmodico-flatulentum,  
*Hoffm.* III. 94.

Asthma fpafticum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae funt,

1. Asthma (*fpontaneum*) fine caufa mani-  
festa, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. fp. 1. flatulentum, *Floyer*  
on the asthma, chap. 1.

Asthma convulfivum, S. fp. 2. *Willis*, Pharm.  
rat. p. 2. Sect. 1. cap. 12. Med. Tr. I. 7.

Asthma hyftericum, S. fp. 3. *Floyer* on the asthma,  
chap. 1.

Asthma stomachicum, S. fp. 8. *Floyer*, Scheme of  
the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea fpafmodica, S. fp. 3.

Orthopnoea hyfterica, S. fp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

Species asthmatis symptomaticae sunt,

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32.

## G. LVI. D Y S P N O E A.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. *Sag.* 251. *Junck.* 32.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269. *Sag.* G. 253. M. 574.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumonicum, *Willis*, Pharm. rat. P.

II. sect. I. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II,

§ 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17. Ed. Eff. III. 25.

2. Dyspnoea (*ficca*) cum tussi plerumque ficca.

Hujus causae variae haud facile dignoscendae sunt ; sequentes autem SAUVAGESII species huc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea (*aërea*) a minima quavis tempestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dyspnoea (*terrea*) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.

Dyspnoea calculosa, M. 574.

5. Dyspnoea (*aquosa*) cum urina parca et oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. sp. 12.

6. Dyspnoea (*pinguedinosa*) in hominibus valde obesis.

Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

7. Dyspnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus laesis, vel male conformatis.

Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.

Dyspnoea Galenica, S. sp. 16.

Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

Asthma a gibbo, S. sp. 9.

8. Dyspnoea (*extrinseca*) a causis externis manifestis.

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.

Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

Dyspnoeae species symptomatice sunt symptomata,

1. Morborum cordis, vel vasorum majorum,

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.

Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.

Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

2. Tumoris abdominalis,

Dyspnoea a physconia, S. sp. 7

Dyspnoea a graviditate, S. fp. 8.  
 Dyspnoea tympanitica, S. fp. 9.  
 Dyspnoea a liene, S. fp. 14.  
 Dyspnoea a stomacho, S. fp. 13.  
 Dyspnoea a gastrocele, S. fp. 17.  
 Orthopnoea a gastrocele, S. fp. 11.

### 3. Variorum morborum,

Asthma febricosum, S. fp. 18.  
 Orthopnoea febricosa, S. fp. 20.  
 Orthopnoea peripneumonica, S. fp. 1.  
 Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. fp. 21.  
 Orthopnoea variolosa, S. fp. 24.

Dyspnoea scorbutica, S. fp. 18.  
 Orthopnoea scorbutica, S. fp. 22.

Orthopnoea a hydrothorace, S. fp. 5.  
 Orthopnoea ab empyemate, S. fp. 13.  
 Orthopnoea a vomica, S. fp. 7.  
 Dyspnoea a vomica, S. fp. 6.

Orthopnoea a hydrocephalo, S. fp. 23.  
 Orthopnoea a vermibus, S. fp. 17.

G. LVII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus ; tussis convulsiva,  
strangulans, cum inspiratione sonora,  
iterata ; saepe vomitus.

*Pertussis Sydenham.* Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

*Huxham* de aëre, ad ann 1732. Lond. Med.

Obf. III. 27. 30. Soc. Royale III. Hist. p. 268.

Tussis convulsiva, five ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

*Amphimerina tussiculosa*, S. sp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LVIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris  
aquei, plerumque insipidi, aliquando  
acris eructata.

*Pyrosis*, S. G. 200. *Sag.* G. 158.

*Soda*, L. 47. V. 154.

SCOTIS, the WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. *Macb.* p. 515.

Caeterae SAUVAGESII species symptomaticae sunt,

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

# G. LIX. C O L I C A.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Sag.* G. 162.

*Junck.* 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

*Macb.* p. 519.

Rachialgia, S. G. 211. *Sag.* G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. *Sag.* G. 187.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

VOL. II. G g



## 234 GENERA MORBORUM

Species idiopathicae sunt,

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus phlyodes, S. sp. 9.

Colica biliosa, S. sp. 5 \*. Edin. Med. Eff. III. 27.

Colica pituitosa, S. sp. 2 †.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis; hinc,

\* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *biliosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmu obstruente fieri videtur; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum, a colo pituita infarcto*, hic apposui.

- a. Colica cum vomitu stercoris, vel rerum per anum injectarum.

*Ileus spasmodicus*, S. sp. 3 \*. Lond. Med. Obs. IV.

17. Edinb. Phys. Ess. II. 27. 28.

*Ileus volvulus*, S. sp. 7.

- b. Colica cum inflammatione superveniente.

*Ileus inflammatorius*, S. sp. 1.

*Colica phlogistica*, S. sp. 6.

2. Colica (*pietorum*) praecedente ponderis vel molestiae in abdomine, praecipue

\* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum* omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoris sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflammatio aliquando adsit, si eadem *colicae* supervenerit, *colicam phlogisticam* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno generis mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum.

circa umbilicum, sensu ; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto ; tandem graviore et fere perpetuo ; cum dolore brachiorum, et dorfi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. \*.

Colica pictonum *Citiesii* et succedentium *Auctorum*.

Med. Transf. I. 12. 13. 14. 15. 20. Edinb.

Phys. Ess. I. 22. *Chalmers's* Carolina, p. 187.

Colica nervosa, *Macb.* p. 524.

Variat ratione causae remotae ; et hinc

a. A veneno metallico.

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

\* *Rachialgiam* a *colica* genere diversam esse nequaquam video. Symptomata enim *colicae* essentialia in utroque morbo semper adsunt ; et si forte alteri quaedam superaddita sint, haec speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam *rachialgiam* appellarunt *ASTRUCIUS* et *SAUVAGESIUS*, pro specie *colicae* habui ac recensui.

Colica pictonum *Tronchin*. Sp. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. fp. 1. *Tronchin*. fp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustia, *Tronchin*. fp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. fp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obstipationem.

Colica stercorea, S. fp. 3.

Ileus a faecibus induratis, S. fp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. fp. 18.

## 238 GENERA MORBORUM

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S. sp. 2.

### 5. Colica (*meconialis*) neophytorum a meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

### 6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinorum parte strictione, et saepe ante eam collecti flatu cum aliquo dolore, qui flatu etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

Ileus a callosa coli strictione, S. sp. 11. Edin. Med. Eff. IV. 31.

### 7. Colica (*calculosa*) cum duritie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15. Edinb. Med. Eff. I. 32.

Edinb. Phys. Eff. II. 26.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicae fympomaticae funt,

Colica febricofa, S. fp. 21.

Rachialgia febricofa, S. fp. 2. *Tronchin.* fp. 1.

Colica hystERICA, S. fp. 17.

Colica gravidarum, S. fp. 16.

Colica verminofa, S. fp. 4.

Ileus verminofus, S. fp. 13.

Colica Lapponica, S. fp. 9.

Rachialgia arthritica, S. fp. 4. *Tronchin.* fp.

Rachialgia fcorbutica, S. fp. 6.

Ileus herniofus, S. fp. 6.

Colica enterocelica, S. fp. 22.

Ileus ab intestino compreffo, S. fp. 4.

Colica fchirrofa, S. fp. 12.

Colica pancreatica, S. fp. 13.

Colica mefenterica, S. fp. 11.

Rachialgia ab osteofarcofi, S. fp. 8.

Colica plethorica, S. fp. 8.

a. Haemorrhoidalis.

b. Catamenialis.

## 240 GENERA MORBORUM

Colica pultatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

### G. LX. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul  
dejectio frequens; anxietas; tormina;  
furarum spasmodica.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Sag. G. 188.  
*Hoffm.* II. 165.

Diarrhoea cholericæ, *Junc.* 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida,  
sine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* sect. IV. cap.  
2. *Cleghorn's* Diseases of Minorca.

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acerbis  
ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. fp. 4.

Cholera a veneno animali, S. fp. 5.

Cholerae symptomaticae sunt,

Cholera intermittens, S. fp. 6.

Cholera inflammatoria, S. fp. 8.

Cholera arthritica, S. fp. 10.

Cholera verminosa, S. fp. 9.

G. LXI.      D I A R R H Œ A.

Dèjectio frequens; morbus non contagio-  
fus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 253. L. 187. V. 105. *Sag.* G.  
189. *Junck.* 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholèrica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. *Sag.* G.  
199.

Enteria, S. G. 256. L. 188. V. 108. *Sag.* G.  
191.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœis, V. 112.

Lambisma ventris fluxus multiplex. Amst. 1756.

Species idiopathicae sunt,

VOL. II.      H h



## 242 GENERA MORBORUM

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercorea naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.

Diarrhoea stercoreosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliosa*) qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acris ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria cathartica, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoea, V. 112.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea ferosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Coeliaca lactea, S. sp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies feroso-cruenta, sine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

## II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.

Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.

Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21.

## 244 GENERA MORBORUM

- Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.
- Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.
- Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17.
- Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.
- Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.
- Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.
- Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.
- Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.
- Coeliaca purulenta, S. sp. 2.
- Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.
- Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
- Lienteria scorbutica, S. sp. 3½
- Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.
- Lienteria aphthosa, S. sp. 4.
- Lienteria secundaria, S. sp. 5.
- Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
- Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
- Diarrhoea chilensis, S. sp. 12.
- Diarrhoea acrafia, S. sp. 7.

### G. LXII. DIABETES.

Urinae plerumque praeternaturalis, copia  
immodica, profusio chronica.

- Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Sag.* G.  
199. *Junck.* 99. *Dobson*, Lond. Med. Observa-  
tions, Vol. V. Art. 27. *Home's* Clinical Experi-  
ments, sect. xvi.
- Dieuresis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris,  
coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons.

Essay 1. *Ejusdem* Monita Med. Cap. IX. sect.

2. Lond. Med. Obs. III. 26. *Dobson*, in Lond.

Med. Obs. Vol. V. Art. 27. *Myers*, Diff.

inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh.* Epist. resp.  
ad *R. Brady* \*.

\* Quaeri potest, an diabetes febricosus SYDEN-  
HAMI ad Diabetem mellitum, an ad insipidum re-  
ferri debeat? Et simul quaeri potest, an urina in  
diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipi-  
da, cum SYDENHAMUS ipse nullibi de sapore uri-  
nae, in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad poste-  
rius respondere possum, quod, ex propria observa-  
tione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico  
nequaquam dulcem, et fere prorsus insipidam, esse,  
et diabetem febricosum SYDENHAMI ad diabetem  
mellitum ideo retuli; quod in simili senis, post diu-  
turnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem in-  
veni.

II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci \*.

*M. Lister* Exerc. medicin. II. de Diabete.

\* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, iisque non paucis, quae viderat WILLISIUS, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperae frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathicae et permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; et ego ipse inter plures mellitas unicam insipidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETAEI et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante WILLISIUM quidem, vel prioris aevi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus WILLISII primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante WILLISIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectae, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrebant, vel negligentes vel malae fidei

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Arctaeus* de Morb. diuturn. L. II. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ.* D. I. A. II. Obf. 122.

Symptomaticae sunt,

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* diff. epist. ad *G. Cole*.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh.* de podagra.

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh.* de lienc.

## G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventris murmura ; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et

fidei fuissent suspicor ; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabetis per renes transeunte prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinae nihil monuisse, mirum videtur ; sed, cum scripta WILLISII, SYDENHAMO fatis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

fauces ascendentes, ibique strangulantis;  
sopor; convulsiones; urinae limpidae  
copia profusa; animus, nec sponte, va-  
rius et mutabilis \*.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. Sag. G.  
242.

Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck. 36.

Affectio hysterica, Willis de morb. convulsiv. cap.  
5. 10. 11. Sydenh. diff. epist. ad G. Cole. Whyt-  
on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathi-  
ca, dicere non possum, nec, ut opinor,

\* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina  
facienda quadantenus exercitatus, quam difficile sit  
inter dyspepsiam, hypochondriam, et hysteriam  
semper accurate distinguere. Genera autem vera, et  
fatis a se invicem distincta, indicasse mihi videor:  
Recte autem, an fecus, fecerim, aliis dijudicandum  
relinquo. Morbos affines facile inter se misceri  
probe novi; et, in quocunque casu, quisnam eorum  
pro primario sit habendus, per characteres nosologi-  
cos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Poste-  
ri, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

recte dixit SAUVGESIUS. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

A. Ab emanfione menfium,

Hysteria chlorotica, S. fp. 2. *Raulin*, cap. 13.

B. A menorrhagia cruenta.

- Hysteria a menorrhagia, S. fp. 3. *Raulin*. *Sydenham*,  
Diff. epist. ad *G. Cole*.

C. A menorrhagia serofa, five fluore albo.

Hysteria a leucorrhoea, S. fp. 4. *Raulin*, cap. 14.

D. A viscerum obftructione.

Hysteria emphrastica, S. fp. 5. *Raulin*, cap. 5.

E. A vitio ftomachi.

Hysteria ftomachica, S. fp. 7. *Raulin*, cap. 4.



F. A falacitate nimia.

Hysteria libidinosa, S. sp. 6\*.

Manifesto symptomatae sunt,

Hysteria verminosa, S. sp. 1. *Delii* Amoenit. Academ.

Hysteria febricosa. S. sp. 8. *Wedel.* in Ephem.  
German. D. I. A. II. Obs. 193.

G. LXIV. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem

\* In speciebus hysteriae recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theoriae subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysteriae species indicasse videtur SAUVAGESIUS, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, cenfeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viventes, sanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

pharyngis dolentem cientis, fastidium  
et horror ; plerumque e morfu ani-  
malis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.*  
343. *Boerb.* 1138. *Junck.* 124. *Mead* on poi-  
sons. *Desault* sur la rage. *Sauvages* diff. sur  
la rage. *James* on canine madness. *Dalby*,  
Virtues of cinnaber and musk against the bite  
of a mad dog. *Nugent* on the hydrophobia.  
*Choisiel*, Nouvelle methode pour le traitement de  
la rage. *Journal de Medecine*, passim. *Lond.*  
*Med. Obs. and Inquir.* Vol. III. Art. 34. Vol. V.  
Art. 19. 26. and App. *Lond. Med. Transf.* Vol.  
II. Art. 5. 12. and 15. *Edinb. Med. Eff.* V. Art.  
51. *Huyssam*, Diff. Inaug. de rab. canin. *Edinb.*  
1777. *Parry*, Diff. inaug. de rab. contagios.  
five canin. *Edinb.* 1778. *Soc. Royale I.* Mem.  
p. 105. 146. *Andry*, Recherches sur la rage,  
1780. *Soc. Royale II.* Hist. p. 229. 230. 456.  
III. Hist. p. 167. *Vaughan*, Cases of hydrophobia,  
second edit. 1778.

Species sunt,

I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum morden-

252 GENERA MORBORUM

di cupiditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. Edinb. Med. Eff. I. 29.

## O. IV. VESANIÆ\*.

\* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quae cum classe VOGELII nona, *Paranoiae* inscripta, eadem omnino sit; sed a classe *Vesaniarum* SAUVAGESII et SAGARI in eo diversa, quod horum auctorum ordines *Hallucinationum* et *Morositatum* prorsus excludat; itidemque a classe *Mentalium* apud LINNÆUM diversa, quod hujus auctoris ordines *Imaginariorum* et *Patheticorum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes* tum *Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum *Vesaniis* striete dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrigium vel Bulimiam, vel aliam *Hallucinationem* sive *Morositatem*, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adfunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes SAUVAGESII et imaginarios LINNÆI ad morbos

## 254 GENERA MORBORUM

Mentis \* judicantis functiones laesae sine  
pyrexia vel comate.

Paranoiae, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. *Sag.* Cl. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

### G. LXV. A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines  
rerum relationes, vel non percipiunt,  
vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. *Sag.* G. 346.

Morosis, L. 106.

morbos locales olim detuli ; et nunc morositates SAUVAGESII et patheticos LINNÆI, antea a nobis omnino omisso, ad locales etiam deferendos esse censui.

\* In priore Nosologiae nostrae editione, has functiones simpliciter mentis esse dixi, minus autem recte ; nam perceptio falsa sive *hallucinatio*, et appetitus erroneus sive *morositas*, quodammodo ad mentis functiones pertinent ; cum vero utraque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunc mutare, et mentis judicantis functiones dicere.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Amnesia \*, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriae debilitas, Junck. 120.

Species sunt,

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

II. Amentia *senilis* ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, immutis.

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

III. Amentia *acquisita* a causis externis,

\* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriantur, et amnesia ingravescens ad amentiam semper ducat.

## 256 GENERA MORBORUM

evidentibus in hominibus sanae mentis  
superveniens.

Amnesia febrilequa, S. sp. 8.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ictu, S. sp. 9.

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in No-  
logia methodica nequaquam recenferi  
debent, cum causae internae a quibus  
characteres desumuntur, per signa ex-  
terna nequaquam dignosci possint.

Amentia ferofa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a ficcitate, S. sp. 7.

Amentia calculosa, S. sp. 12.

## G. LXVI. MELANCHOLIA.

Infania \* partialis sine dyspepsia †.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Sag.*

G. 347. *Boerb.* 1089. *Junk.* 121.

Daemonomania, S. G. 236. *Sag.* 348.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.

\* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem excitentur.

† Hypochondriasis et melancholia non semper distingui possunt. Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.



## 258 GENERA MORBORUM

Erotomania, L. 82.

Noſtalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag. G.* 338. *Junk.*  
125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia,  
P. I.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat. Ita eſt

1. Cum hallucinatione de ſtatu corporis fui a levibus cauſis periculoſo; vel de ſtatu rerum ſuarum triſti metuendo.

Melancholia vulgaris, S. ſp. 1.

Melancholia argantis, S. ſp. 4.

Panophobia phrontis, S. ſp. 3.

2. Cum hallucinatione de ſtatu rerum ſuarum jucundo.

Melancholia moria, S. ſp. 5.

Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.

Melancholia faltans, S. ſp. 8.

3. Cum amore vehementi ſine ſatyriaſi vel nymphomania.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Erotomania, L. 82.

4. Cum superstitioso futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

5. Cum averfatione motus et omnium vitae officiorum.

Melancholia atonita, S. sp. 6.

6. Cum inquietudine et ftatus cujusvis impatientia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

7. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglica \*, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

6. Cum hallucinatione de fua speciei natura.

\* Apud Anglos fortaffis taedium vitae non femper a morbo pendet.

## 260 GENERA MORBORUM

Melancholia zoantropica, S. fp. 12.

Melancholia hippantropica, S. fp. 9.

Melancholia scytharum, S. fp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse cen-  
seo\*, et nostra sententia species sub hoc  
titulo a SAUVAGESIO recensitae sunt,  
vel,

### 1. Species melancholiae five maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. fp. 5.

Daemonomania Indica, S. fp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemo-  
num potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. fp. 4.

Daemonomania Polonica, S. fp. 8.

Daemonomania a cardiogmo, S. fp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania fagarum, S. fp. 1.

\* Ita cenfeo, quia daemonum in nostra corpora,  
vel hisce temporibus in mentes nostras, potentiam  
ullam esse pauci jam credunt.

Daemonomania vampirismus, S. sp. 2.

Daemonomania simulata, S. sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2.  
partim simulati, ut 3tio, recensiti, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

G. LXVII. M A N I A.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Sag.* G. 349.

*Beerh.* 1118. *Junck.* 122. *Battie* on madness.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

1. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate  
mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi morborum capitis; ex terrore, apud *Lecherum* de mania; ex amore apud *Ephem. Nat. Cur. Dec. II. A. X. Obs.* 126.; ex ira apud *Hoffman.* III. p. 263.

## 262 GENERA MORBORUM

### 2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis ; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

ab ulcere ficcato *Amat. Lusitan.* Cent. II. cur. 67.

a resecta plica, *Hoffm.* tom. III. p. 263. *Ephem.*

N. Cur. Cent. I. Obf. 35.

a represso herpete, *Locher* de mania.

a menstruis retentis *Schenck.* Obf. p. 142.

a femine retento, *Schenck.* ibid.

a repressa scabie, *Lorry* de melancholia, tom. II.

P. II. cap. 3.

a graviditate, *Lorry*, P. I. cap. 7.

a parciore lactis et lochiorum fluxu, *Puzos*, 3.  
Mem.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

### 3. Mania (*obscura*) praegresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Phrenitis apyreta, S. fp. 10.

Mania periodica, S. fp. 6.

Maniae species symptomatice sunt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. *Sag.* G. 345.

1. Paraphrosyne a venenis,

Paraphrosyne temulenta, S. fp. 1.

Paraphrosyne a datura, S. fp. 2.

Paraphrosyne ab opio, S. fp. 3.

Paraphrosyne a conio, S. fp. 4.

Paraphrosyne magica, S. fp. 5.

2. Paraphrosyne a pathemate, S. fp. 7.

Paraphrosyne hysterica, S. fp. 12.

3. Paraphrosyne febrilis.

Delirium, L. 65. V. 330.

Paraphrosyne febricosa, S. fp. 10.

Paraphrosyne critica, S. fp. 11.

Paraphrosyne calentura, S. fp. 9.

Paraphrosyne puerperarum, S. fp. 8.

G. LXVIII. ONEIRODYNIA.

In fomno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulifmus, S. G. 221. L. 77. *Sag.* G. 333.

Hyprobatafis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. *Sag.* 245.

Incubus, V. 211. *Junck.* 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulifmus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulifmus catalepticus, S. sp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

*Ephialtes verminosa*, S. sp. 4.

*Ephialtes ex hydrocephalo* \*, S. sp. 3.

\* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcunque referri possit.



## CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus ; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII. *Sag.* Cl. III.  
Deformes, L. Cl. X.

## O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I. *Sag.* Cl. III. O. I.  
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

## G. LXIX. T A B E S.

Marcor ; asthenia ; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. *Sag.* G. 100.

Species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica,

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Variat fere ; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis\*, S. sp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

\* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cum pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

## 268    G E N E R A   M O R B O R U M

Atrophia infantilis, S. fp. 13.

Atrophia rachitica, S. fp. 8.

Tabes rachialgica, S. fp. 16.

### 3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. fp. 17.

Atrophia *febrisæqua*, S. fp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae, pertinet.

## G. LXX.    A T R O P H I A.

Marcor et asthenia, sine pyrexia \* hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. Sag. G. 102. *Junc.* 41.

Marasmus, L. 211.

Species sunt,

\* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, faltem sine pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia pyrexiae hecticae, (pag. 80.) fere semper atrophiam a tabe distinguit.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

Tabes dorsalis \*, S. sp. 1.

Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Tabes a sanguifluxu, S. sp. 2.

Sanguinis inopia Ill. Lieutaud. synopf. univ  
med. vol. I. pag. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.

Atrophia lactentium, S. sp. 3.

\* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam debiliū, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi videtur, et ad posteriorem referre mallet.

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, 12.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, prægressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia fenilis, S. sp. 11.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum  
tumens.

Intumescentie, S. Cl. X. O. II. *Sag.* Cl. III. Q. II.  
Tumidofi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *A D I P O S Æ.*

G. LXXI. *P O L Y S A R C I A.*

Corporis pinguedinosa intumescencia mo-  
lesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G.  
106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, S. fp. 1. Lond. Med. Obs. III.  
9. V. 21. 22. Med. Transf. II. 18.

Sect. II. *FLATUS Æ.*

G. LXXII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. *Sag.* G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

*Combalusier* de flatulentis corporis humani affectibus.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa manifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot. Lond. Med. Obs. VI. 19.

2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere thoracis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Lond. Med. Obs.

II. 2. III. 4. 35. 36. *Cheston*, chap. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

### G. LXXIII. TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tenfa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. Sag.

G. 118. Boerb. 226. Junck. 87.

Affectio tympanitica, Hoffm. III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inequali, et cum rejectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.



## 274 GENERA MORBORUM

Tympanites intestinalis, S. fp. 1. Edinb. Med. Eff.

I. 31.

Tympanites enterophyfodes, S. fp. 3.

Tympanites verminofus, S. fp. 7.

Tympanites fpafmodicus, S. fp. 5.

Meteorifmus ventriculi, S. fp. 1.

Meteorifmus abdominis, S. fp. 2.

Meteorifmus hyftericus, S. fp. 3.

Meteorifmus a manzanilla, S. fp. 4.

2. Tympanites *abdominalis* cum refonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emiffione flatuum rariori et minus levante.

Tympanites abdominalis, S. fp. 2.

Tympanites afciticus, S. fp. 4.

Afcites flatulento-peritoneus, S. fp. 28.

Tympanites Stewartii, S. fp. 6.

## G. LXXIV. P H Y S O M E T R A.

Tumor levis, elafticus, in hypogaftrio figuram et fedem uteri referens.

Phyfometra, S. G. 290. *Sag.* G. 117.

Hyfterophyfe, V. 317.

Species sunt,

Phyfometra ficca, S. fp. 1.

Tympanites uteri ficca, *Astruc*, sur les malad.  
des femmes, L. II. cap. 9.

Phyfometra humida, S. fp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc*, loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPE.*

G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescen-  
tia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Sag.* G.  
108. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.  
*Monro* on the dropfy, 1765. *Milman*, Animad-  
versiones de hydrope, 1779.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerb.* 791.

Species sunt,

1. Anasarca (*serosa*) a retento sero ob e-  
vacuationes solitas suppressas, vel ab  
aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

Anasarca metastatica, S. fp. 1.

a. Anasarca periodica.

## 276. GENERA MORBORUM

b. Anasarca ab adiapneustia.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Anasarca urinosa, S. sp. 11.

Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

### 2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Angina Loweriana, S. sp. 2.

Angina oedematosa, Boerb. 791.

### 3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3.

Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

4. Anafarca (*anaemia*) a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

Anafarca a fluxu, S. fp. 2.

5. Anafarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Phlegmatia vulgaris, S. fp. 1.

Anafarca a febribus, S. fp. 4.

Anafarca hysterica, S. fp. 2.

Phlegmatia hysterica, S. fp. 2.

Anafarca rachialgica, S. fp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. fp. 11.

Anafarca purulenta, S. fp. 9. vix ad anafarcam referri potest.

## G. LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. Boerh. 1217,

Hydrocephalum, V. 384.

## 278 GENERA MORBORUM

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2 \*. Lond. Med.  
Obs. V. 13. Med. Transf. II. 18. Edinb. Med.  
Eff. III. 22.

### G. LXXVII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,  
exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn. de sed. XII.*  
9. et seq.  
Spinola, L. 289.  
Spina bifida, V. 386.

### G. LXXVIII. HYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;  
urina parca; decubitus difficilis; subita  
et spontanea ex somno cum palpitatione  
excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. *Boerb. 1219.*

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

\* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum,  
ad Apoplexiam, sub nomine Apoplexiae hydrocephali-  
cae, jam supra retuli.

Hydrothorax febrisequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabiè, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque fedes, per signa externa dignosci queat.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis*, Pharm. rat. P. I. sect. 1. Cap. 13.

Hydrothorax hydatidofus, S. sp. 5. *Morg.* de fed. XVI. 33.

Hydrothorax mediaftini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. p. 337. *Bergeron*, diff. de hydrope pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morg.* de fed. XVI. 34. 35. *Senac* de coeur, tom. II. p. 349. *Edinb. Med. Eff.* V. 56. 58. 59.

Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

## G. LXXIX. ASCITES.

Abdominis intumescencia tenfa, vix elastica, sed fluctuosa.

## 280 GENERA MORBORUM

Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Sag.* G. 115.  
*Boerb.* 1226. *Hoffm.* III. p. 322. *Junck.* 87.  
*D. Monro* on the dropfy, 1765. *Med. Transf.*  
II. 17. *Milman*, Animadversiones de hydrope,  
1779.

### Species sunt,

1. Afcites (*abdominalis*) cum tumore totius abdominis aequali, et cum fluctuatione satis evidente.

Afcites vulgatiore, S. sp. 1.

### Varietate ratione causae.

#### A. Ab oppilatione viscerum.

Afcites ab oppilatione, S. sp. 2.

Afcites ab hepate, S. sp. 3.

Afcites a liene, S. sp. 4.

Afcites scrophulofus, S. sp. 5.

Afcites artificialis, S. sp. 10.

#### B. A debilitate.

Afcites ab exanthematis, S. sp. 8.

Afcites arthriticus, S. sp. 9.

Afcites febrilis, S. fp. 12.

Afcites ex quartana, *Werlhof*.

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.

### C. A tenuitate fanguinis.

Afcites a fanguifluxibus, S. fp. 7.

### Variat etiam ratione liquidi effufi.

Afcites purulentus, S. fp. 21 \*.

Afcites urinosus, S. fp. 22.

Afcites chylofus, S. fp. 23.

Afcites oleofus, S. fp. 24.

2. Afcites (*faccatus*) cum tumore abdominis, faltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.

Afcites ab ovariis, S. fp. 6.

Afcites ovarii, S. fp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. fp. 6.

Afcites cruentus, S. fp. 20. Edinb. Med. Eff. V.

63.

\* De hisce et pluribus aliis afcitis speciebus recensitis idem notandum est, ac in pag. 279.

VOL. II.

N n



Afcites stomachi, S. fp. 16.

Afcites omentalis, S. fp. 18.

Afcites intercus, S. fp. 14.

Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.

Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.

Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

### G. LXXX.    HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Sag.* G. 116. *Boerh.* 1224.

Species per externa signa distinguendae vix dari possunt; sed sequentes ex SAUVAGESIO recensentur.

Hydrometra ascitica, S. fp. 1.

Hydrometra gravidarum, S. fp. 2.

- Hydrometra hydatica, S. sp. 4.  
 Ascites uterinus, S. sp. 15.  
 Hydrometra sanguinea, S. sp. 3.  
 Ascites sanguineo-uterinus, S. sp. 25.  
 Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

G. LXXXI. H Y D R O C E L E.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

- Oscheocce, S. G. 41. V. 388.  
 Oscheophyma, *Sag.* G. 44.  
 Hydrops scroti, V. 389.  
 Hydrops testium, *Boerb.* 1227.

Species sunt,

- Oscheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Med. Eff.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran*, *Operations de Chirurgie.* *Bertrandi* in *Mem. de l'Acad. de chirurgie*, Vol. III.  
 Oscheocele hydatidosa, S. sp. 3.  
 Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer*, *Amoen. exot. fasc.* III. obf. 7.

Sect. IV. SOLIDÆ.

G. LXXXII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. G. 283. V. 325. Sag. G. 110.  
Hypofarca, L. 218.

Species sunt \*,

Physonia hepatica, S. sp. 1.

Cl. *Cusson*. Bonet. Sepulchr. de graviditate falsa, obf. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. *Schirrhouea*. G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obf. 142.

\* Species sequentes nequaquam ad normam Nomenclologiae methodicae recensentur, sed accuratius physconiae species indicare difficile foret, faltem plus exegisset, quam quo nunc fruor otii. Interim *Cussoni* doctissimi opus summae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

- b. *Calculosa Bonet*. Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.
- c. *Hydatidosa Winckeri* Disp. de hydatidibus apud *Bonet*. Med. Septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

- a. *Emphraetica Haller*. Disp. pathol. T. IV. Disp. 109. *Tulp*. Obs. med. lib. II. cap. 30.
- b. *Schirrboëa Bonet*. Sepulchr. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3.

- Bonet*. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.
- a. *Calculosa Plater*. Obs. L. II. p. 449. *River*, cent. IV. obs. 34.
  - b. *Sarcomatico-cystica Haller*. Disp. pathol. Disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4.

- Bonet*. Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

## 286 GENERA MORBORUM

### Phyſconia ab ovario, S. ſp. 5.

*Monro*, Edinb. Med. Eff. tom. VI. Art. 74. obf. 1.

### Phyſconia meſenterica, S. ſp. 6.

- a. *Hydatidoſa* *Greg. Horſtii*, Lib. 5. obf. 33.  
*Tulp.* obf. Lib. II. c. 34.
- b. *Strumofa* *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obf. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII. c. 21. *Scultet.* *Armam.* chirurg. obf. 38.
- c. *Schirrodea* *Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* conſult. Sect. II. conſult. 134. *Trincavell*, lib. III. conſ. 22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de fedib. ep. 39. n. 2.
- d. *Sarcomatica* *Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obf. 3. n. 1.
- e. *Steatoniatoſa*, *Barth. Cabrol.* Obf. 33. et 35.  
*Tulp.* Obf. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lecheli* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. Idem Collect. acad. tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. Acad. tom. III. p. 226. Obf. 166.
- f. *Fungofa*, *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3.

*Physconia intestinalis*, S. sp. 7.

- a. *Concreto-glomerata*, *Morgagn.* de fedib. epist.  
39. n. 21. 25.
- b. *Sarcomatica*, *Fontan.* Obs. med. selectiores,  
obs. 11.

*Physconia omentalis*, S. sp. 8.

*Frid. Reebman* Diff. de omento.

*Physconia polysplachna*, S. sp. 9.

- a. *Schirrbokea*, *Fabr. Hildani* cent. II. obs. 45.
- b. *Schirrbokea et sarcomatica*, *Huldenreich*, Misc.  
Nat. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.
- c. *Schirrbokea et adiposa*, *T. Bartholin.* cent. III.  
obs. 6.
- d. *Hydatidosa*, *Velch. Coiter.* Obs. anat. p. 117.  
*Maur. Cordaei* comm. 5. ad lib. priorem,  
*Hippocr.* de muliebr.
- e. *Hydatidosa et schirrbokea*, *Halleri* Disp. pathol.  
Tom. V. p. 256.

*Phyſconia viſceralis*, S. ſp. 10.

*Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. *Megaloplachnos Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex *Garnero* de liene, Lib. III. Obſ. 9. *Salmuth.* cent. I. obſ. 21. *Bonet.* Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt. hepat. T. I. p. 130.

*Phyſconia externa lupialis*, S. ſp. 11.

*Graham* Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

*Phyſconia externa ſcirrhodea*, S. ſp. 12.

*Ger. Blaſ.* Obſ. med. VI.

*Phyſconia externa hydatidofa*, S. ſp. 13.

*Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. § 2. 3. 4. 11. &c. *Achozii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obſ. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. Sect. V. *Riverii* Obſ. communicat. ultim.

Physconia ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.

- a. *Simplex*, Cl. *Lieutaud*. Comp. med. *J. Mich.*  
*Febr.* apud *Bonet*. Med. sept. T. I. p. 636.
- b. *Syphilitica*, observante celeb. *Fizes*.

Physconia ab excrescentia, S. sp. 15.

### G. LXXXIII. R A C H I T I S.

Caput magnum anterius maxime tumens;  
genicula tumida; costae depressae; ab-  
domen tumidum; caetera marcescen-  
tia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Sag.* G.  
120. *Boerb.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani*  
della rachitide.

Variat,

1. *Simplex* sine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

VOL. II. O o



## 290 GENERA MORBORUM

Rachitis Britannica \*, S. fp. 2. *Gliffon* de rachitide.

### 2. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. fp. 3.

Rachitis Polonica, S. fp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. fp. 6.

Neque rachitis *calmucana*, S. fp. 4. neque  
rachitis *a castratione*, S. fp. 7. pro mor-  
bo haberi potest.

\* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur ra-  
chitis *nodosa* et *Britannica*, cum non differant aliter  
quam morbus incipiens et confirmatus.

### O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. *Sag.* Cl. III. O. V.

### G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. *Sag.* G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp. 1.

## 292 GENERA MORBORUM

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum infolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*) simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula (*Americana*) cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulae pertinere mihi videtur.

## G. LXXXV. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. *Sag.* G. 126.

Lues venerea, *Boerb.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.*

96. *Astruc* de lue venerea

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

## G. LXXXVI. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Sag.* G. 127. *Boerb.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junc.* 91. *Lind* on the scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Rouppé* de morbis navigantium, *Med. Transf.* II. 18. 21. *Milman* on the Scurvy. *Ferris* de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine, Ed. 1784.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d Scorbutus lividus, *Nitzsch*, *Theoret. pract.* ab *Handl. des Scharbockes*, &c.

- e.* Scorbutus petechialis, *Nitzsch*, *ibid.*
- f.* Scorbutus pallidus, *Nitzsch*, *ibid.*
- g.* Scorbutus ruber, *Nitzsch*, *ibid.*
- h.* Scorbutus calidus, *Nitzsch*, *ibid.*

## G. LXXXVII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberculibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V 321 *Sag.* G. 128.  
Elephantia Arabum, V. 322.

Varietates sunt,

- Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.
- Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*  
Vol. I. Art. 19. Soc. Royale I. mem. p. 161.
- Elephantiasis leonina, S. sp. 3.
- Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.
- Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.
- Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.
- Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

## 296    GENERA MORBORUM

Fungi, mori, vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Elephantiasis Indica, S. sp. 9. \*.

### G. LXXXVIII.    L E P R A.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. *Sag.* G. 129.

Lepra Graecorum, V. 320.

Varietates sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

### LXXXIX.    F R A M B O E S I A.

\* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

Framboesia, S. G. 229. *Sag.* G. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. *Edinb. Essays*,  
Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. XC.      T R I C H O M A.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores,  
in cirrhos et funiculos inextricabiles  
implicati.

Trichoma, S. G. 311. *Sag.* G. 137.

Plica, L. 313.

Plica five Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

VOL. II.

P p



## G. XCI. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albidæ ;  
urina obscure rubra, immixta colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306. *Sag. G.* 132.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species idiopathicae sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regione epigastrica acuto, post pactum aucto, et cum dejectione concretionum biliosarum.

Aurigo calculosa, S. sp. 9. *Edinb. Med. Eff.* I. 33. II. 28. 29. *Med. Transf.* II. 10.

2. Icterus (*spasmodicus*) sine dolore, post morbos spasmodicos et pathemata mentis.

Aurigo hysterica, S. sp. 13.

Species quaedam, quae a SAUVAGESIO sub titulo

Auriginis a venenis, recensentur.

3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van Swiet.* ad *Boerb.* Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes, siquidem recte icteri dicantur \*, symptomatae sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

\* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet, excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter cuticulam

## 300 GENERA MORBORUM

*Aurigo febricosa*, S. sp. 8.

*Aurigo accidentalis*, S. sp. 2.

*Aurigo typhodes*, S. sp. 10.

*Aurigo rachialgica*, S. sp. 14.

*Aurigo a venenis*, S. sp. 4.

*Aurigo Indica*, S. sp. 3. five quarundam  
gentium color naturalis, nequaquam  
pro morbo haberi potest.

cuticulam effusa; vel a sero sanguinis saepe flavescente, subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibusdam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum causarum oriatur, apud medicos non semper constat; sed tantum ex prima icterum genuinum, et ab altera morbum diversum, quique, quantum fieri possit, distingui debet, oriri censemus.

## CL. IV. LOCALES \*.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia † S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. *Sag.* Cl. I.

Plagae, S. CL. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Morbi organici *Auctorum.*

\* Fortassis aliquando ambiguum esse potest, utrum ad universales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri classi referendi sint, fatis obvium erit; et ex institutione hujus *Localium* classis, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum nosologorum systematibus, disponi posse contendimus.

† *Vitia* hic dixi, utpote sub hac classe *Localium* comprehensa; morbos vero multo plures comprehendit hic classis, ita ut vox *vitia* pro hujus synonymo nequaquam haberi potest, et idem de *Plagis SAGARI* dictum velim.

O. I. DYSÆSTHESIE.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum  
externorum vitio \*.

Dysæsthesiæ, S. CL. VI. O. I. *Sag.* Cl. IX.  
O. I.

Hallucinationes, S. Cl. VIII. O. I. *Sag.* Cl. XIII.  
O. I.

Privativi, L. CL. VI. O. III.

G. XCII CALIGO.

Vifus imminutus, vel prorfus abolitus, ob  
repagulum opacum, inter objecta et re-  
tinam, oculo ipfo vel palpebris inhae-  
rens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. G. 259.

Cataracta, L. 109.

\* Vereor ne in fequentibus aliquando species  
recenfuerim quae characteri ordinis non prorfus  
refpondeant, quafdam, fcilicet, dysæsthesias quae  
ex organorum externorum vitio non pendeant. Hu-  
jufmodi species quidem aliquando recenfui; fed  
paucae omnino funt, et feci, quia species affines, et  
hic loci expectandas, feperare nolui.

Species sunt,

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam  
pone pupillam.

Cataracta \*, S. G. 152. L. 109. V. 239. *Sag.* G.  
26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, verae  
vel spuriae :

Verae varietates sunt.

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhoufii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3.

Glaucoma *Maitre Jan* et *St Ives*.

Spuriae varietates sunt,

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

\* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta*  
pro diverso a *Caligine* genere haberi possit ; et judi-  
cent petiti, annon ideo recte *Caliginis* characterem  
mutaverim, et *cataraclam* pro ejus specie posuerim.

## 304 GENERA MORBORUM

### 2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

- Achlys, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. fp. 5.

Caligo a leucomate, S. fp. 6.

Caligo ceratocete, S. fp. 10.

Caligo a staphylomate, S. fp. 11.

Caligo a pterygio, S. fp. 12.

Caligo hyposphagma, S. fp. 13.

### 3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupillam.

Variat pro varietate causae.

Caligo ab ectasi, S. fp. 18.

Amaurosis a synchysi, S. fp. 6.

Amaurosis a myosi, S. fp. 7.

Caligo a synizefi, S. fp. 19.

Synizefis, V. 240.

### 4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaema, S. fp. 15.

Caligo lactea, S. fp. 16.

Caligo a rhytidofi, S. fp. 17.

Amblyopia hydrophthalmica, S. fp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharofi, S. fp. 1.

Caligo ab ancyloblepharo, S. fp. 2.

Caligo a blepharoptofi, S. fp. 3.

Caligo a pacheablepharofi, S. fp. 4.

Caligo a lupia, S. fp. 7.

Caligo a farcomate, S. fp. 8.

Caligo a cancro, S. fp. 9.

## G. XCIII. A M A U R O S I S.

Vifus imminutus vel prorfus abolitus, fine vitio oculi evidente ; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.



## 306 GENERA MORBORUM

Amaurosis, S. G. 135. L. 110. V. 238. Sag. G.  
261.

Mydriasis, V. 237.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et  
cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.

Amaurosis scrophulosa, S. sp. 3.

Amaurosis plethorica, S. sp. 4.

Amaurosis intermittens, S. sp. 13.

Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.

Amaurosis venerea, S. sp. 10.

Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum  
signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5.

Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.

Amaurosis rachialgica, S. sp. 14.

Amaurosis arthritica, S. sp. 17.

Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et cum signis spasmi.

Amaurosis a spasmo, S. sp. 8.

Amaurosis hysterica, S. sp. 15.

4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12.

Amaurosis foricariorum, S. sp. 9.

G. XCIV. D Y S O P I A \*.

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

\* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis nomine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt tum veteres, tum LINNÆUS et VOGELIUS; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

## 308. GENERA MORBORUM

Species sunt,

1. Dyfopia (*tenebrarum*) in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dyfopia (*luminis*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dyfopia (*diffitorum*) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopiasis, V. 515.

4. Dyfopia (*proximorum*) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dyfopia (*lateralis*) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia luscorum, S. sp. 5.

# G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Vifus depravatus, ita ut quae non exiftant homo fe videre imaginatur, vel quae exiftunt aliter videt ac revera fe habeant.

Suffufio, S. G. 217. *Sag.* G. 329.

Phantafma, L. 73. V. 289.

Species funt,

1. Pseudoplepsis (*imaginaria*) in qua quae non exiftunt confpici videntur.

Variat pro varietate phantafmatis.

a. Suffufio myodes, S. fp. 1.

b. Suffufio reticularis, S. fp. 2.

c. Suffufio fcintillans, S. fp. 3.

Marmaryge, V. 290.

## 310. GENERA MORBORUM

- d. Suffusio coloris, S. sp. 4.  
Hæmalopia, V. 239.

### 2. Pseudoblepsis (*mutans*) in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.

#### Variat pro varia objectorum mutatione.

- a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.  
b. Suffusio nutans, S. sp. 7.  
c. Suffusio dimidians objecta, S. sp. 6.  
d. Suffusio multiplicans.  
Diplopia, S. G. 218. Sag. G. 330.  
Dysopia, V. 291.

#### Diplopia iterum variat pro varietate causae remotae.

- α. Diplopia pyretica, S. varietas 1.  
β. Diplopia a spasmo, S. Var. 2.  
γ. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.  
δ. Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. 4.  
ε. Diplopia a catarrho, S. Var. 5.  
ζ. Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

- η. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- θ. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- ι. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- κ. Diplopia remotorum, S. Var. 7.

## G. XCVI. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 246. Sag. G. 264.  
 Cophosis, S. G. 160. L. 112. Sag. G. 266.  
 Surditas, V. 247.

Species sunt,

- 1. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis fonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectae.

- a. Dysecoea monotonon seu malcorum, S. sp. 1.
- b. Dysecoea a meatu obstructo, S. sp. 2.
- Gophosis a meatu, S. sp. 1.

c. Dysecoea a myringae atonia, S. sp. 3.

Cophosis a tympano, S. sp. 4.

d. Dysecoea a myringae duritie, S. sp. 4.

e. Dysecoea a myringa perforata, S. sp. 5.

f. Dysecoea a tympani fistula, S. sp. 6.

g. Dysecoea a hydrotympano, S. sp. 7.

h. Dysecoea a tuba obstructa, S. sp. 8.

Cophosis a tuba, S. sp. 3.

i. Dysecoea syphilitica.

Cophosis syphilitica.

Cophosis congenita, S. sp. 8.

2. Dysecoea (*atonica*) sine organorum fo-  
nos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causae.

a. Cophosis critica, S. sp. 2.

Dysecoea febrilis.

b. Cophosis a comate, S. sp. 7.

c. Cophosis ferosa, S. sp. 6.

d. Cophosis a steatmate, S. sp. 9.

G. XCVII. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159. *Sag.* G. 265.

Syrigmus, S. G. 219. *Sag.* G. 231.

Species sunt,

1. Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycoea, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycocæ, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, S. sp. 3.



d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. fp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Syringmos, L. 72.

Sufurrus, V. 292.

Variat pro varietate soni percepti.

a. Syrigmus fibilus, S. fp. 4.

b. Syrigmus sufurrus, S. fp. 5.

c. Syrigmus bombus, S. fp. 11.

Variat etiam pro varietate causae remotae.

d. Syrigmus a debilitate, S. fp. 1.

e. Syrigmus criticus, S. fp. 2.

f. Syrigmus plethoricus, S. fp. 3.

g. Syrigmus vertiginosus, S. fp. 10.

- h. Syrigmus cephalalgicus, S. fp. 6.
- i. Syrigmus a ventriculo, S. fp. 7.
- k. Syrigmus catarrhalis, S. fp. 8.
- l. Syrigmus ab oxycoca, S. fp. 9.

## G. XCVIII. A N O S M I A.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. *Sag.* 262.

Species sunt,

- 1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

- Anosmia catarrhalis, S. fp. 1.
- Anosmia a siccitate, S. fp. 6.
- Anosmia a polypo, S. fp. 3.
- Anosmia ab ozaena, S. fp. 2.
- Anosmia syphilitica, S. fp. 4.
- Anosmia verminosa, S. fp. 5.

## 316 GENERA MORBORUM

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

### G. XCIX. AGHEUSTIA.

Guftus imminutus vel abolitus.

Agheuftia, S. G. 157. Sag. G. 263.

Agheuftia, L. 114.

Apogeufis, V. 449.

Species funt,

1. Agheuftia (*organica*) ob vitium in membrana linguae, a nervis fapida arcens.

Agheuftia febrilis, S. sp. 1.

2. Agheuftia (*atonica*) sine vitio linguae evidente.

Agheuftia paralytica, S. sp. 2.

G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118. *Sag.* G. 267.

Anodynia, V. 274.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur, et, cum de iis mihi non fatis liqueat, nihil mutare volui.

Anaesthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anaesthesia plethorica, S. sp. 2.

Anaesthesia nascentium, S. sp. 3.

Anaesthesia melancholica, S. sp. 4.

O. II. DYSOREXIAE\*.

Appetitus erroneus vel deficiens.

Seçt. I. *APPETITUS ERRONEI.*

*Morositates*, S. G. VIII. O. II. *Sag.* Cl. XIII.

O. II

*Pathetici*, L. Cl. V. O. II.

*Hyperaesthesiae*, V. Cl. VII.

G. Cl. BULIMIA.

Appetitus esculentorum majori copia quam quae digeri possit.

\* *Morositates* SAUVAGESII minus recte ad *Vejuniarum* classem referri, supra dixi, et nunc ad locales detuli. Recte, ni fallor, cum dysorexiae fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem revera morbus sit, minime pro locali haberi potest; sed morbum incertum a caeteris dysorexiis separare non bene potui.

Bulimia, S. G. 223. L. 79. *Sag.* 335.

Bulimus, V. 296.

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species idiopathicae sunt,

1. Bulimia (*belluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

Bulimia esurigio, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.

Bulimia cardialgica, S. sp. 2.

Bulimus, V. 296.

3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

Bulimia canina, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.

Species fymptomaticae funt,

*Bulimia verminosa*, S. fp. 3.

*Bulimia addephagia*, S. fp. 5.

*Bulimia convulforum*, S. fp. 6.

*Bulimia ab acidis*, S. fp. 7.

## G. CII. POLYDIPSIA.

*Appetitus majoris folita copiae potulentorum.*

*Polydipsia*, S. G. 224. L. 80. V. 275. *Sag.* G. 336.

*Polydipsia* fere femper fymptomatica eft, et variat tantum pro varietate morborum quos comitatur ; hinc

*Polydipsia febrilis*, S. Var. a.

*Polydipsia hydropica*, S. Var. b.

*Polydipsia fluxuum*, S. Var. c.

*Polydipsia a venenis*, S. Var. d.

G. CIII. P I C A.

Defiderium non efculenti ingerendi.

Pica, S. G. 222. *Sag.* G. 334.

Citta, L. 78.

. Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

Cum de speciebus *picae* mihi non fatis li-  
queat, fequentes ex SAUVAGESIO re-  
cenfeo.

Pica infantilis, S. fp. 1.

Pica chlorofiantium, S. fp. 2.

Pica malacia, S. fp. 3.

Pica abfcorbuticorum, S. fp. 4.

Pica voluntaria, S. fp. 5.

G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriafis, S. G. 228. L. 81. *Sag.* G. 340.

Satyriafim pro fpecie maniae habet VOGELIUS.



## 322 GENERA MORBORUM

Species sunt,

Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretaei Cappad.* Acut.  
Lib. II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et Satyriasis venerea, S. sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. manifesto symptomata est,

### G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium,

Nymphomania, S. G. 229. *Sag.* G. 341.

Satyriasis, L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet VOGELIUS.

Nymphomaniae species unica est, et gradu tantum varians, hinc

Nymphomania falacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

## G. CVI. NOSTALGIA.

In absentibus a patria, vehemens eandem revivendi desiderium.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag.* G. 338.

Nostalgiam pro specie melancholiae habet VOGELIUS.

Species sunt,

1. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostalgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

Sect. II. *APPETITUS DEFICIENTES.*

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* IX. O. II.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

G. CVII. *A N O R E X I A.*

*Appetitus esculentorum deficiens.*

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. *Sag.* G. 268.

Omnis anorexia mihi symptomatrica esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitae, ad genus dyspepsiae supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculi gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertae naturae sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.

## 326 G E N E R A M O R B O R U M

### G. CVIII. A D I P S I A.

Appetitus potulentorum suppressio, five fitis  
feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. *Sag.* G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

Pro morbo habere nollem ; omnemque a-  
dipsiam pro sympathica, five symptoma-  
te morbi cujusdam, sensorium commune  
afficientis, habeo ; ideoque non ad lo-  
cales referendi.

### G. CIX. A N A P H R O D I S I A.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodifia, S. G. 164. *Sag.* G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agenefia, V. 283.

Species verae sunt,

Anaphrodifia paralytica, S. sp. 1.

Anaphrodifia gonorrhoeica, S. sp. 2.

Species spuriae, five veneris rite exercendae  
impedimenta, sunt,

Anaphrodifia a mariscis, S. sp. 4.

Anaphrodifia ab urethrae vitio, S. sp. 5 \*.

Pro ficta et falsa habenda est

Anaphrodifia magica, S. sp. 3.

\* Ad dyspermatifini genus pertinet.

### O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organo-  
rum vitio.

Dyscinesiae, S. Cl. VI. O. III. *Sag.* Cl. IX. O. III.

### G. CX. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syn-  
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. *Sag.* G. 272.

Species sunt,

1. Aphonia (*gutturalis*) a tumefactis fau-  
cibus et glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa *Mor-*  
*gagni.*

2. Aphonia (*trachealis*) a compressa trachea.

Aphonia aneurismatica, S. fp. 5.

Aphonia pulmonica, S. fp. 9.

3. Aphonia (*atonica*) a nervis laryngis resectis.

Aphonia traumatica, S. fp. 6.

Sequentes symptomaticae esse videntur,

Aphonia melancholica, S. fp. 1.

Aphonia paralytica, S. fp. 8.

Aphonia temulentorum, S. fp. 3.

Aphonia hysterica, S. fp. 7.

Aphonia ab antipathia, S. fp. 2.

G. CXI. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 165. V. 257. Sag. G. 271.

VOL. II. T t



## 330 GENERA MORBORUM

Species sunt,

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4.

Mutitas a ficitate, S. sp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae laesis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomatae sunt,

Mutitas a glossocele, S. sp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. sp. 3.

Mutitas spasmodica, S. sp. 6.

Mutitas proaeretica, S. sp. 7.

## G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis fonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Cacophonia, Sag. G. 274.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa paupertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviolem et ingratam mutatur.

Paraphonia puberum, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob ficcitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

## 332. GENERA MORBORUM

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalis, S. sp. 2.

Paraphonia a polypo, S. sp. 8.

Rhenophonia, V. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Afaphia, V. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4.

Paraphonia sibilans, S. sp. 7.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, fonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. fp. 6.

## G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ifchnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

1. Psellismus (*haesitans*) in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile pro-

## 334 GENERA MORBORUM

feruntur, et non nisi prima syllaba fac-  
pius repetita.

Pfellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ifchnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Pfellismus (*ringens*) in quo sonus literae R semper aspiratur, et quasi geminatur.

Pfellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five blaefitas, V. 258.

3. Pfellismus (*lallans*) in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronuntiatur.

Pfellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Pfellismus (*emolliens*) in quo literae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.

Pfellismus traulotes, S. sp. 4.

5. Pfellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Pfellismus balbuties, S. sp. 5.

Pfellismus a ranula, S. sp. 11.

6. Pfellismus (*acheilos*) in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Pfellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Pfellismus (*lagostomatum*) in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Pfellismus lagostomatum, S. sp. 10.

Pfellismus cotacismus, S. sp. 8.

## 336 GENERA MORBORUM

### G. CXIV. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. Sag. G.  
222.

Species sunt,

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine  
prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi  
prae altero, debilitate vel mobilitate ma-  
jori, adeo ut uterque oculus non com-  
mode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3.

Strabismus spasmodicus, S. sp. 4.

Strabismus paralyticus, S. sp. 5.

Strabismus catarrhalis, S. sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1.

Strabismus caligantium, S. sp. 11.

Strabismus a crystallino, S. sp. 12.

Strabismus myopum, S. sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes.

Strabismus symptomaticus, S. sp. 7.

Strabismus lagophthalmos, S. sp. 8.

## G. CXV. D Y S P H A G I A.

Molestia deglutitionem impediens sine respirationis laesione vel phlegmasia.

Dysphagia, S. G. 199. *Sag.* G. 216.

Acataposis, V. 149.



## 338. GENERA MORBORUM

Species a SAUVAGESIO recensitae sunt,

1. Dyſphagia ſpaſmodica.
2. ——— hyſterica.
3. ——— paralytica.
4. ——— pharyngea.
5. ——— oefophagea.
6. ——— lactentium.
7. ——— tuſſiculofa.
8. ——— hydrophobica.
9. ——— naufeofa.
10. ——— a deglutitis.
11. ——— a datura.
12. ——— a farcomate.
13. ——— ab ſchirro.
14. ——— canina.
15. ——— valſalviana.
16. ——— aneurifmatica.
17. ——— a labario.
18. ——— a ficcitate.
19. ——— ab hypoftaphyle.

## G. CXVI. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. Sag. G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

Species sunt,

1. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. sp. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spasmo rigidis.

Contractura spasmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spasmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens; S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

## 349 GENERA MORBORUM

Contractura paralytica, S. sp. 4.

Contractura rachialgica, S. sp. 5.

Contractura Bohemica, S. sp. 6.

Obstipitas annuens, S. sp. 2.

### d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

### 2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura anchylosis, S. sp. 9.

Contractura syphilitica, S. sp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. sp. 4.

O. IV. A P O C E N O S E S.

Fluxus five fanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenosfes, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

G. CXVII. P R O F U S I O.

Fluxus fanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerb.* 218.

Ex fanguifluxibus, a SAUVAGESIO recentis, fequentes, ad hunc locum pertinere videntur.

Haemorrhagia paffiva, S. fp. 1.

Haemoptysis traumatica, S. fp. 12.

Haematemesis traumatica, S. fp. 3.

Haematuria traumatica, S. fp. 14.

Haematuria violenta, S. fp. 2.

Haemorrhagia ab hirudine, S. fp. 7.

Haemoptysis a hirudine, S. fp. 13.

Haematemesis ab hirudine, S. fp. 4.

## G. CXVIII. EPHIDROSIS\*.

Sudoris praeter naturam evacuatio.

Ephidrosis, S. G. 258. *Sag.* G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathicae unica est,

Ephidrosis spontanea, S. fp. 1.

\* Ephidrosin minus recte ad morbos locales relatum esse agnoscio; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prorsus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinis morbis evacuatoriis recensui.

Ephidroses symptomaticae variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate sudoris elicit, et quodammodo pro varietate partis maxime sudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricosa, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematicum, S. sp. 6.

Ephidrosis synoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a faburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephidrosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis caerulea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

## 344 GENERA MORBORUM

### G. CXIX. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. *Sag.* G.  
195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Caeterae omnes symptomatae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex aegilope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.

G. CXX. PTYALISMUS.

Fluxus falivae.

Ptyalifimus, S. G. 261. L. 176. V. 103. *Sag.* G.  
197.

Si quis ptyalifimus idiopathicus fit, pro eo  
habere vellem

Ptyalifimum a laxitate, S. fp. 4.

Sequentes omnes fymptomaticae sunt,

- Ptyalifimus nauseofus, S. fp. 1.
- Ptyalifimus hypochondriacus, S. fp. 8.
- Ptyalifimus gravidorum, S. fp. 14.
- Ptyalifimus a pyrofi, S. fp. 2.
- Ptyalifimus Lapponicus, S. fp. 3.
- Ptyalifimus febrilis, S. fp. 18.
- Ptyalifimus variolofus, S. fp. 6.
- Ptyalifimus arthriticus, S. fp. 9.
- Ptyalifimus phthificus, S. fp. 10.
- Ptyalifimus fcorbuticus, S. fp. 7.
- Ptyalifimus catarrhalis, S. fp. 15.
- Ptyalifimus aphthofus, S. fp. 13.



## 346 GENERA MORBORUM

Ptyalifmus a carie, S. sp. 16.

Ptyalifmus purulentus, S. sp. 12.

Ptyalifmus a calculo, S. sp. 17.

Ptyalifmus syphiliticus, S. sp. 19.

Ptyalifmus viridis, S. sp. 11.

Ptyalifmus urinosus, S. sp. 20.

Ptyalifmus mercurialis, S. sp. 5.

### G. XXI. ENURESIS.

Urina e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. Sag. G. 200.

Species sunt,

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

Enuresis herniosorum, S. sp. 3.

Enuresis puerperarum, S. sp. 5.

Enuresis, calculosa, S. sp. 7.

Enuresis a fistula, S. fp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel  
irritatione vesicae.

Enuresis gravidarum, S. fp. 4.

Enuresis catamenialis, S. fp. 6.

Enuresis a sparganosi, S. fp. 9.

Symptomaticae est,

Enuresis paralytica, S. fp. 2.

Pro morbo non haberi potest

Enuresis infantum, S. fp. 1.

## G. CXXII. G O N O R R H O E A.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel  
absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhoea, S. G. 258. L. 200. V. 118. *Sag.*  
G. 204.

Species sunt,

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea pura, S. sp. 1.

Gonorrhoea benigna *Auctorum*.

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea syphilitica, S. sp. 4.

Gonorrhoea maligna *Auctorum*.

Hujus sequela est,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, post gonorrhoeam impuram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.

Anglis, a GLEET.

3. Gonorrhoea (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhoea (*dormientium*) in qua liquor feminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex fomnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhoea oneirogonos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit.

Gonorrhoea spuria, S. sp. 5. *Astruc*, lib. 3. cap. 3. § 2.

Gonorrhoea balani, S. sp. 6.

O. V. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Suppressorii, L. Cl. VIII. O. II.

Suppressiones, *Sag.* CL. VI.

G. CXXIII. OBSTIPATIO.

Dejectio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, L 166. V. 128. *Sag.* G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis *Colicae* 1<sup>mae</sup>, 2<sup>dae</sup>, 4<sup>tae</sup>, vel 7<sup>mae</sup> supra dictae.

## G. CXXIV. I S C H U R I A.

Urinae suppressio absoluta.

Ifschuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. *Sag. G.*  
212. *Home's Clinical Experiments*, sect. XV.  
Lond. Med. Obs. V. Append.

Species sunt,

1. Ifschuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto, gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad minguendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc \*

\* Doctissimi CUSSONI Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUVAGESIANO inserui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species CUSSONI summatim hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

## 352 GENERA MORBORUM

- a. *Nephritica*, a renum inflammatione, S. fp. 1.
  - b. *Nephrolithica*, a renum calculo, S. fp. 2. E-  
dinb. Med. Eff. II. 31.
  - c. *Nephroplethorica*, a plethora, S. fp. 3.
  - d. *Lunatica, periodica*, S. fp. 4.
  - e. *Nephrospastica*, spasmodica, S. fp. 5.
  - f. *Nephrelmintica*, verminosa, S. fp. 6.
  - g. *Nephrothromboides*, a fanguine congrumato,  
S. fp. 7.
  - h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. fp. 8.
  - i. *Nephrophlegmatica*, pituitosa, feu mucosa, S.  
fp. 9.
  - k. *Nephroplegica*, paralytodaëa, S. fp. 10.
  - l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. fp. 11.
2. *Ischuria (ureterica)* praegressio renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. fp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. fp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S. fp. 14.

- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterostomatica*, ab orificii ureterum inferioris clausura, S. sp. 17.

3. Ischuria (*vesicalis*) cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Cystitica*, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicae calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospastica*, a sphincteris vesicae spasmō, S. sp. 20.
- d. *Cystoplegica*, a vesicae paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distenta lotio diutius cohibita, S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectopocystica*, a vesicae ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.



## 354 GENERA MORBORUM

- l. *Hysterocystica*, ab utero, S. fp. 28.
- m. *Atretarum*, a menstruis in vagina retentis, S. fp. 29.
- n. *Paradoxa*, S. fp. 30.

4. *Ischuria (urethralis)* cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Perinaealis*, a perinaei tumore, S. fp. 31.
- b. *Urethrolithica*, a calculo urethrae impacto, S. fp. 32.
- c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infarciēte, S. fp. 33.
- d. *Urethrobomboides*, a sanguinis grumo urethram opplente, S. fp. 34.
- e. *Urethropyica*, a pure urethram obstruente, S. fp. 36.
- f. *Urethrohymenodes*, a membrana in urethram impacta, S. fp. 36.
- g. *Urethrelmintica* verminosa, S. fp. 37.
- h. *Urethritica*, ab urethrae inflammatione, S. fp. 38.
- i. *Carunculosa*, a morbis ut vocant urethrae, S. fp. 39.

- k. *Hydrocelodes*, ab urethrae ruptura in scrotum hiantē, S. fp. 40.
- l. *Cryptopyica*, a penis intra corpus retractione, S. fp. 41.
- m. *Peridesmica*, a vinculo strictiori peni injecto, S. fp. 42.
- n. *Phimofica*, a phimosi, S. fp. 42.
- o. *Aspadialis*, ab urethrae clausura, S. fp. 44.

## G. CXXIV. D Y S U R I A.

Dolorifica et quodammodo impedita urinae emissio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. Sag. G. 213.  
Stranguria *Auctorum*.

Species sunt,

- 1. *Dysuria (ardens)* cum ardore urinae sine morbo vesicae evidente.

Dysuria primaria, S. fp. 5.

Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.

## 356 GENERA MORBORUM

Dysuria arsuræ, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

### 2. Dysuria (*spasmodica*) a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Dysuria hysterica, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabetica, S. sp. 17.

Dysuria nephralgica, S. sp. 3.

### 3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cystocele, S. sp. 8.

Dysuria ab hysteroloxia, S. sp. 10.

Dysuria atretarum, S. sp. 16.

### 4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis,

Dysuria ab hysteritide, S. sp. 9.

Dysuria haemorrhoidalis, S. sp. 6.

Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dyfuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.

Dyfuria calculofa, S. fp. 12.

6. Dyfuria (*mucosa*) cum excretionem muci copiosa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucosa, S. fp. 6.

Pyuria viscida, S. fp. 5.

Rarus vesicae morbus, Hoffm. T. IV. Consult.

Med. Centur. II. cas. XCIII.

Catarrhus vesicae Lieutaud. Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. fp. 9.

De dyfuria ab infectis, S. fp. 15. mihi non satis liquet.

G. CXXV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. Sag. G. 211.

Agenesia, V. 283.

## 358 GENERA MORBORUM

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. fp. 1.
2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. fp. 2.
3. Dyspermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. fp. 3.
4. Dyspermatismus (*mucosus*) a mucositate urethram infarciēte, S. fp. 4.
5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. fp. 5. Edinb. Eff. I. 35.
6. Dyspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. fp. 6.
7. Dyspermatismus (*apraetodes*) a genitalium ignavia, S. fp. 7.

8. Dyspermatismus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.

De dyspermatismo feroso, S. sp. 8. mihi non satis constat.

G. CXXVI. AMENORRHŒA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciore, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhoea, V. 130.

Dysmenorrhoea, L. 168. Sag. G. 218.

Species sunt, '

1. Amenorrhoea (*emansiois*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum, menses, non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidæ adsint.

## 360 GENERA MORBORUM

2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.

O. VI. T U M O R E S.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tumores protuberantes, L. Cl. X. O. V.

G. CXXVIII. A N E U R I S M A.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* G. 35.

G. CXXIX. V A R I X.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. *Sag.* G. 36.

G. CXXX. E C C H Y M O M A.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

VOL. II. Z z



## 362 GENERA MORBORUM

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. *Sag.* G. 5.

Sugillatio, L. 230.

### G. CXXXI. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,  
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. *Sag.* G. 19.  
*Boerb.* 392.

### G. CXXXII. CANCER.

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali  
moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerb.* 492. *Sag.*  
G. 25.

### G. CXXXIII. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. *Sag.* G. 21.

Parotis, S. G. 17. V. 370. *Sag.* G. 22.

G. CXXXIV. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. *Sag.* G. 28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXXXV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G. 30.

G. CXXXVI. C L A V U S.

Cuticulae craffities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

G. CXXXVII. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,  
non dolens.

## 364 GENERA MORBORUM

Lupia, S. G. 37. *Sag.* G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

### G. CXXXVIII. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini infidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

### G. CXXXIX. HYDATIS.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. *Sag.* G. 38.

Phlyctæna, L. 273. V. 442.

### G. CXL. HYDARTHROS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELLING.

Reimarus de fungo articulorum, Leid 1757.

Chéston Path. Inq. Chap. V.

Edinb. Eff. IV. 18. 19. 20.

G. CXLI. EXOSTOSIS.

Tumor durus offi infidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417. *Sag.* G. 34.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII. ECTOPIÆ\*.

Pars ex sua fede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI. *Sag.* Cl. I. O. VI.

G. CXLII. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXLIII. PROLAPSUS.

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

\* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, pag. 15, et seq. inveniri, et summo cum fructu perlegi possunt.

G. CXLIV. L U X A T I O.

Os ex sua in juncturis fede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60. *Sag.* G. 67.

Diafasis, S. 61. *Sag.* G. 68.

Luxatura, L. 237.

O. VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.

O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXLV. V U L N U S.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag.* G. 78.

*Boerh.* 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243. *Sag.* G. 79.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243. *Sag.* G. 86.

G. CXLVI. U L C U S.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249. *Sag.* G. 89.  
 Exulceratio, S. G. 72. *Sag.* G. 90.  
 Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag.* G. 92.  
 Fiftula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag.* G. 91.  
*Boerb.* 413.  
 Cacoethes, L. 250. V. 485.  
 Phagedaena, V. 488.  
 Moma, L. 251. V. 489.  
 Carcinoma, L. 252. V. 487.  
 Ozaena, L. 253. V. 500.  
 Achor, L. 265. V. 494.  
 Crufta, V. 494.  
 Therioma, V. 486.  
 Sycofis, V. 390.

G. CXLVII. H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag.* G. 11.

G. CXLVIII. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag.* G. 131.



## 370. GÉNÉRA MORBORUM

### G. CXLVIX. P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. *Sag.* G. 130.

### G. CL. F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Sag.* G. 98. *Boerb.* 339.

### G. CLI. C A R I E S.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493. *Sag.* G. 94.

# I N D E X.

## CLASSIUM ET ORDINUM.

*Numeri post literas S. L. V. Sag. et M.  
paginas tomi primi ; post C. paginas tomi  
secundi, indicant.*

**A** DYNAMIÆ, V. 183. M. 364. C. 198.  
et 324.

Aerifluxus, S. 63. Sag. 293.

Agitatorii, L. 110.

Alvi fluxus, S. 59. Sag. 291.

Alvi fluxus non fanguinolenti, S. 60. Sag.  
288.

Alvi fluxus fanguinolenti, S. 59. Sag. 287.

Anepithymiae, S. 43. Sag. 312. C. 324.

Anhelationes, S. 39. Sag. 306. M. 365.

Anhelationes oppressivae, S. 40.

Anhelationes suppressivae, Sag. 307.

Apocenos, V. 166. C. 340.

Cachexiae, S. 65. V. 194. Sag. 267. M.  
367. C. 266.

Cachexiae anomalae, S. 81. Sag. 276.

Clonici generales, S. 37. Sag. 303.

Clonici partiales, S. 35. Sag. 301.

Comata, S. 46. Sag. 315. C. 183.

Concretiones, V. 224.

Continentes, L. 90. C. 68.

Continuae, S. 26. V. 151. Sag. 333. C. 66.

Constrictorii, L. 116.

Critici, L. 90. C. 44.

Cystides, S. 13. Sag. 250.

Debilitates, S. 42. Sag. 310.

Decolotes, L. 124.

Defectivi, L. 105. C. 198.

Deformationes, L. 136.

Deformes, L. 122. C. 266.

Deformitates, V. 226. Sag. 259.

- Deliria, S. 56. Sag. 343. C. 254.  
Dialyses, C. 367.  
Dialytica, L. 126.  
Diffolutiones, V. 218. C. 367.  
Dolores, S. 48. V. 171. Sag. 279. M.  
358.  
Dolorosi, L. 97.  
Dolorosi extrinseci, L. 99.  
Dolorosi intrinseci, L. 97.  
Dysaesthesiae, S. 42. Sag. 310. C. 302.  
Dyscinesiae, S. 44. Sag. 312. C. 328.  
Dyforexiae, C. 318.
- Ectopiae, S. 14. Sag. 252. C. 365.  
Efflorescentiae, S. 8. Sag. 244.  
Emaciantes, L. 122. C. 266.  
Epischeses, V. 170. C. 349.  
Evacuatorii, L. 117. C. 340.  
Exacerbantes, L. 91. C. 46.  
Exanthemata, Sag. 318. C. 130.  
Exanthematicae, S. 29. V. 154. C. 131.  
Exanthematici, L. 87. C. 131.  
Excrefcentiae, S. 11. Sag. 248.

Extuberantiae, V. 212.

Exulcerationes, L. 128. C. 367.

Febres, S. 26. V. 149. Sag. 333. M. 349.

C. 44.

Fluxus, S. 58. Sag. 286. M. 356. C.

340.

Haemorrhagiae, V. 164. C. 153.

Hallucinationes, S. 54. Sag. 338.

Humoralia, L. 125.

Hydropes, C. 275.

Hydropes partiales, S. 66. Sag. 270.

Hyperaesthesiae, V. 191. C. 318.

Icteriae, S. 80. Sag. 275.

Ideales, L. 101. C. 254.

Imaginarii, L. 102.

Impetigines, S. 79. Sag. 273. C. 291.

Inflammationes, V. 201. M. 354.

Intermittentes, S. 28. V. 149. L. 90. Sag.

336. C. 45.

Intumescenciae, S. 65. Sag. 268. C. 271.

Leipopsychiae, S. 45. Sag. 314. C. 198.

Locales, C. 301.

Macies, S. 65. Sag. 267. C. 266.

Maculae, S. 7. L. 138. V. 216. Sag. 247.

Marcores, C. 266.

Mentales, L. 101. M. 366.

Morositates, S. 55. Sag. 340. C. 318.

Motorii, L. 109. C. 210.

Neuroses, C. 182.

Paranoiae, V. 199. C. 254.

Pathetici, L. 102. C. 318.

Phlegmasiae, S. 29. Sag. 325. C. 82.

Phlogistici, L. 93. C. 83.

Phymata, S. 9. Sag. 246.

Plagae, S. 23. Sag. 261. C. 301. et 367.

Privativi, L. 107. C. 302. et 324.

Procidentiae, L. 135.

Profluvia, V. 164. C. 172.

Pustulae et Papulae, V. 214.

Pyrexiae, C. 43.

Quietales, L. 105.

Remittentes, S. 27. Sag. 335. C. 45.

Sanguifluxus, S. 58. Sag. 286. C. 153.

Scabies, L. 130.

Serifluxus, S. 61. Sag. 291.

Solutiones, Sag. 261.

Soporosi, L. 106. C. 183.

Spasmi, S. 34. V. 177. Sag. 399. M. 363.  
C. 210.

Spastici, L. 109.

Suffocatorii, L. 113.

Suppressiones, Sag. 295.

Suppressorii, L. 113.

Tonici generales, S. 35. Sag. 300.

Tonici partiales, S. 34. Sag. 399.

Tubera, S. 78. Sag. 272.

Tumidofi, L. 123. C. 271.

Tumores, V. 202. C. 362.

Vefaniae, S. 54. Sag. 338. C. 251.

Vitia, S. 7. L. 125. V. 201. Sag. 243.  
C. 301.



# INDEX GENERUM.

- A** BORTIO, V. 97 C. 39.  
 Abortus, S. 245 L. 205. *Sag.* 180 C. 39.  
 Abscessus, L. 233 V. 354 C. 7  
 Acataposis, V. 149  
 Achlys, V. 242 C. 92  
 Achor, L. 265 V. 494 C. 145  
 Acrochordon, V. 426  
 Acyefis, V. 282.  
 Addephagia, V. 297 C. 101  
 Adiapneustia, *Sag.* 210  
 Adipfia, S. 163 L. 117 V. 281 *Sag.* 269 C. 108  
 Adynamia, V. 225.  
 Aedopsophia, S. 273 *Sag.* 208  
 Aegilops, V. 499  
 Aestus volaticus, V. 220  
 Agalaxis, V. 133  
 Agenesia, V. 283 C. 109, 125  
 Ageustia, L. 114 C. 99  
 Agheustia, S. 157 *Sag.* 263 C. 99  
 Aglactatio, L. 170 *Sag.* 214.  
 Aglutitio, L. 164  
 Agomphyasis, V. 482  
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286 *Sag.* 351  
 Algor, S. 191 *Sag.* 150  
 Allotriophagia, V. 299 C. 103  
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525 *Sag.* 138  
 Alvi fluxus, M. 356\*.  
 Amatoria, V. 17  
 Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 *Sag.* 261 C. 93

\* Numeri post litteram M. paginas tomi primi indicant.

- Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 *Sag.* 258 C. 93, 94  
 Ambustio, *Sag.* 97  
 Amenorrhoea, V. 130 C. 126  
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337. *Sag.* 346 C. 65, 67  
 Amnesia, S. 237 *Sag.* 349 C. 65  
 Amphemerina, S. 84 L. 20 *Sag.* 321 C. 3  
 Amputatio, *Sag.* 86  
 Amputatura, S. 70 L. 242 C. 144  
 Anacatharsis, S. 262 *Sag.* 198 C. 40  
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 *Sag.* 267 C. 100  
 Anaphrodisia, S. 164 *Sag.* 270 C. 109  
 Anapleuris, V. 478  
 Anasarca, S. 281 L. 216 V. 313 *Sag.* 108 C. 75  
 Anatrope, V. 280.  
 Anchyloblepharon, V. 504  
 Anchyloglossum, V. 507  
 Anchylomerisma, *Sag.* 76  
 Anchylops, V. 364  
 Anchylofis, L. 287 V. 508  
 Aneurisma, S. 32 L. 282 V. 408 *Sag.* 35 C. 127  
 Angina, S. 147 L. 46 V. 49 *Sag.* 217 C. 10  
 ——— convulsiva, V. 196  
 Angone, V. 196  
 Anhelatio, L. 157  
 Anoia, V. 337  
 Anodynia, V. 284 C. 100  
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 *Sag.* 268 C. 107, 45  
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 *Sag.* 262 C. 98  
 Anthrax, S. 19 L. 273 V. 353 *Sag.* 24 C. 7  
 Antipathia, S. 225 L. 83 V. 285 *Sag.* 337

- Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134 *Sag.* 146  
Apella, L. 312 V. 546 *Sag.* 73  
Apepsia, V. 276 C. 45  
Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253 *Sag.* 272 C. 110  
Aptha, S. 100 L. 9 V. 501 *Sag.* 298 C. 35  
Apthofa, V. 44 C. 35  
Apnoea, V. 265.  
Apogeufis, V. 249 C. 99  
Apogeufia, V. 294  
Apomyttosis, S. 127 *Sag.* 234  
Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 *Sag.* 288 C. 42  
Apoplectica, V. 72  
Apostema, S. 39 *Sag.* 42 C. pag. 86  
Aposyrma, V. 477  
Aquula, V. 445  
Archoptoma, V. 395  
Arctura, L. 262  
Ardor, S. 192 *Sag.* 151  
Argemon, V. 498.  
Aridura, S. 278 L. 227 *Sag.* 104  
Artetiscus, V. 554  
Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 *Sag.* 142 M. 358 C. 24  
Arthrocace, S. 78 L. 257 *Sag.* 95 C. 7  
Arthrodynia, C. p. 122  
- Arthropuosis, C. 25  
Asaphia, V. 250 C. 112  
Ascites, S. 288 L. 218 V. 314 *Sag.* 114 C. 79  
Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 *Sag.* 281 C. 44  
Affodes, V. 27  
Asthénia, S. 172 L. 92 V. 223 *Sag.* 278.

Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 *Sag.* 252 M. 365 C. 55  
 Atecnia, L. 119 C. 109  
 Atheroma, L. 286 V. 420 C. 137  
 Athymia, V. 329 C. 66  
 Atochia, V. 172  
 Atonia, L. 120 C. 43  
 Atreta, L. 313 V. 549  
 Atrophia, S. 277 L. 211 V. 308 *Sag.* 102 M. 367 C. 70  
 Attritio, V. 475  
 Aurigo, S. 306 *Sag.* 132 C. 91

## B

Bacchia, L. 271 *Sag.* 9 C. 7  
 Balbuties, V. 259  
 Batrachus, V. 80  
 Battarismus, V. 261 C. 113  
 Beriberia, S. 137 L. 140 *Sag.* 244  
 Blaefitas, V. 258  
 Blepharoptosis, S. 43 *Sag.* 46  
 Blepharotis, V. 342  
 Blestrismus, V. 135  
 Boa, V. 446  
 Bombus, V. 302  
 Borborismus, L. 123  
 Bronchocele, S. 28 V. 369  
 Bubo, S. 16. L. 272 V. 368. *Sag.* 21. C. 132  
 Bubonoccele, V. 396 *Sag.* 58  
 Bulimia, S. 223 L. 79 *Sag.* 335 C. 101  
 Bulimus, V. 296 C. 101  
 Bullofa, V. 41 C. 34

## C.

- Cachexia, L. 221 V. 304  
 Cacoethes, L. 251 V. 485 C. 146  
 Cacophonia, *Sag.* 274 C. 112  
 Cacofitia, L. 87  
 Caligo, *S.* 153 V. 288 *Sag.* 259 C. 92  
 Callus, V. 429 C. 136  
 Calvities, V. 529  
 Cancer, S. 20 V. 375 *Sag.* 25 M. 368 C. 132  
 Canities, V. 525.  
 Capistrum, V. 208 C. 49  
 Caput obstipum, V. 513 C. 116  
 Carcinoma, S. 296 L. 253 V. 487 *Sag.* 122 C. 145  
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157 *Sag.* 160 C. 45  
 Cardiognus, S. 201 V. 152 *Sag.* 159  
 Carditis, S. 111 V. 54 *Sag.* 302 C. 13  
 Carebaria, V. 144  
 Caries, S. 77 L. 256 V. 493 *Sag.* 94 C. 151  
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330 *Sag.* 231  
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 *Sag.* 287 C. 42  
 Cataclasis, V. 202  
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 *Sag.* 282 C. 42  
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 *Sag.* 286 C. 42  
 Cataplyxis, V. 137  
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 *Sag.* 260 C. 92  
 Catarrhalis, V. 73  
 Catarrhexis, V. 91  
 Catarrhus, S. 186 V. 98 *Sag.* 145 C. 40  
 ——— suffocativus, V. 270  
 Catoche, V. 230

- Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 *Sag.* 229 M. 363 C. 48  
 Caufos, V. 20  
 Cedma, V. 168  
 Celfa, V. 303  
 Cephalaea, S. 194 V. 141 *Sag.* 153  
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140 *Sag.* 152  
 Cephalitis, S. 109 *Sag.* 310 C. 9  
 Cercosis, V. 535  
 Cerion, V. 496  
 Chemosis, V. 46 C. 8  
 Chilon, V. 366  
 Chiragra, V. 139.  
 Chlorosis, S. 309 L. 223 V. 305 *Sag.* 135. C. 47  
 Cholera, S. 253 L. 187 V. 110 *Sag.* 188 C. 60  
 Cholericæ, L. 191 V. 28 C. 61  
 Cholosis, V. 536  
 Choreæ, L. 139 V. 193 C. 51  
 Chylaria, V. 117  
 Cicatrix, L. 318 V. 509  
 Cillofis, V. 203  
 Cinclefis, V. 201  
 Cionis, V. 150  
 Circocèle, V. 409  
 Citta, L. 78 C. 103  
 Clamor, V. 206  
 Clangor, V. 251 C. 112  
 Claudicatio, S. 131 *Sag.* 238  
 Clavus, L. 279 V. 142, 428 C. 130  
 Clitorifimus, L. 299  
 Clunefia, V. 167 C. 7  
 Cocyta, L. 258

- Coeliaca, S. 255 L. 190 V. 109 *Sag.* 190 C. 61  
Coilima, V. 373  
Colica, S. 204 L. 50 V. 160 *Sag.* 162 M. 361 C. 59  
Coloboma, V. 534  
Colpocele, *Sag.* 61  
Colpoptosis, *Sag.* 53  
Coma, V. 232 M. 364 C. 42  
Combustura, L. 246 C. 7  
Condyloma, S. 24 L. 294 V. 378 *Sag.* 29  
Contractura, S. 119 L. 300 *ag.* 225 C. 116  
Contusio, S. 66 V. 480 *Sag.* 83  
Contusura, L. 239  
Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 *Sag.* 235. M. 363  
C. 59  
Cophosis, S. 160 L. 112 *Sag.* 266 C. 96  
Coryza, S. 260 L. 175 V. 100 *Sag.* 196 C. 40  
Crampus, S. 120 V. 194 *Sag.* 226.  
Crepitus, L. 195.  
Cripforchis, V. 551  
Crithe, V. 434  
Crufta lactea, V. 495 C. 145  
Cyasma, V. 461  
Cynanche, S. 110 L. 33 *Sag.* 300 C. 10  
Cynorexia, V. 298 C. 101  
Cyphosis, V. 512  
Cyrtoma, V. 405  
Cyffotis, V. 71  
Cystirrhagia, V. 93 C 39  
Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 *Sag.* 309 C. 20  
Cystocele, S. 56 V. 404  
Cystoptosis, V. 394

## D

- Dacryoma, V. 506  
 Dactylion, V. 510  
 Daemonia, L. 69 C. 66  
 Daemonomania, S. 236 *Sag.* 348 C. 66  
 Decimana, V. 9 C. 2  
 Deliquium, M. 364  
 Delirium, V. 330 L. 65  
 Deuteria, V. 132  
 Diabetes, S. 263 L. 198 V. 115 *Sag.* 199 C. 62  
 Diabrosis, V. 481  
 Diachalasis, V. 474  
 Diaphthora, V. 278 C. 45  
 Diaphragmitis, *Sag.* 304 C. 11  
 Diaria, L. 11 C. 4  
 Diarrhoea, S. 254 L. 188 V. 105 *Sag.* 189 C. 61  
 Diastasis, S. 61 *Sag.* 68 C. 144  
 Digitium, L. 228 V. 221 *Sag.* 173 C. 116<sub>1</sub>  
 Dionysiscus, V. 553  
 Diplopia, S. 218 *Sag.* 330 C. 95  
 Distortio, L. 303  
 Distrix, V. 526  
 Diuresis, V. 114 C. 62  
 Dolor capitis, M. 359  
 ——— ventriculi, M. 360  
 Duplicana, L. 18 C. 1, 2  
 Dysæcoca, S. 158 V. 246 *Sag.* 264 C. 96  
 Dysenteria, S. 248 L. 192 V. 107 *Sag.* 183 C. 41  
 Dyslochia, L. 169 V. 131 *Sag.* 215  
 Dyshaemorrhoids, *Sag.* 220  
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170 *Sag.* 218 C. 126



Dysfodia, S. 274 V. 125 *Sag.* 109

Dysfopia, V. 291 C. 94

Dyspepsia, V. 277 C. 45

Dyspermatismus, S. 269 C. 125

Dysphagia, S. 199 *Sag.* 216 C. 115

Dyspnoea, S. 144 L. 160 V. 267 *Sag.* 251 M. 365  
C. 56

Dysstocia, S. 208 V. 171 *Sag.* 219

Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164 *Sag.* 213 C. 124

## E

Ecchymoma, S. 6 V. 451 *Sag.* 5 C. 130

Eclampsia, S. 133 V. 189 *Sag.* 240 M. 363 C. 53

Ecphyse, V. 124

Ecplexis, V. 334

Ecstasis, S. 177 V. 333 *Sa.* 283 C. 42

Ecthlymma, V. 475

Ecthymata, V. 360

Ectropium, L. 297 V. 518

Eilema, V. 161

Elcosis, S. 313 *Sag.* 139

Elephantia Arabum, V. 322 C. 87

Elephantiasis, S. 302 V. 321 *Sag.* 128 C. 87

Elodes, V. 21

Elytrocele, V. 402

Emphysema, S. 13 L. 229 V. 392 *Sag.* 18 M. 367  
C. 72

Empyema, S. 151 L. 159 V. 358 *Sag.* 257 M. 365 C.  
p. 107

Encanthis, V. 430

Encauma, V. 450

- Encaufis, V. 158, 347 C. 7  
Encephalocele, S. 57 V. 383 *Sag.* 64  
Encyrtis, V. 420 C. 137  
Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57. *Sag.* 307 C. 16  
Enterocele, S. 50  
——— ovularis, V. 400  
Enthusiasmus, V. 335  
Entropium, V. 519  
Enuresis, S. 254 L. 196 V. 113 *Sag.* 200 C. 121  
Ephelis, S. 3 L. 326. V. 438 *Sag.* 3  
Ephemera, S. 79 C. 4  
Ephialtes, S. 138 L. 163 *Sag.* 245 C. 68  
Ephidrosis, S. 258 *Sag.* 194 C. 118  
Epiala, V. 19  
Epidosis, *Sag.* 75  
Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188 *Sag.* 241 M. 363 C. 53  
Epinyctis, S. 8 V. 441 *Sag.* 12  
Epiphlogisma, V. 179  
Epiphora, S. 259 L. 173 V. 99 *Sag.* 195 C. 119  
Epiplocele, S. 51  
Epiploitis, S. 106 *Sag.* 308 C. 14  
Epistaxis, V. 82 C. 36  
Episthotonos, V. 182 C. 48  
Epulis, V. 363  
Erotomania, L. 82 C. 66  
Errana, L. 19 C. 2  
Erratica, S. 90 C. 2 *Sag.* 327  
Erysielacea, V. 68 C. 26  
Erysielas, S. 97 L. 10 V. 343 *Sag.* 296 C. 26, 7  
Erythema, S. 11 *Sag.* 16 C. 7  
Eschara, S. 76 L. 281 V. 483 *Sag.* 93  
Esophage, V. 439

- Effera, S. 99 *Sag.* 297  
 Exania, S. 47 *Sag.* 50  
 Exarthrema, S. 60 *Sag.* 67 C. 144  
 Excoriatio, S. 65 *Sag.* 82  
 Excoriatura, L. 247  
 Exoche, V. 440  
 Exocyste, S. 48  
 Exocystis, *Sag.* 51  
 Exomphalus, S. 40 *Sag.* 43  
 Exoneirofis, V. 120  
 Exophthalmia, S. 42 *Sag.* 45  
 Exostosis, S. 29 L. 291 V. 417 *Sag.* 34 C. 141  
 Expectoratio, L. 179 C. 40  
 Exulceratio, S. 72 *Sag.* 90 C. 146

## F

- Fatuitas, V. 336 C. 65  
 Favus, V. 496  
 Febris continua, M. 349  
 ———intermittens, M. 350  
 ———remittens, M. 351  
 ———exanthematica, M. 352  
 ———Hæctica, M. 353  
 Fissura, S. 68 V. 469 *Sag.* 99  
 Fistula, S. 74 L. 255 V. 491 *Sag.* 91 C. 146  
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127 *Sag.* 207 C. 45  
 Flemen, V. 425  
 Fletus, L. 149  
 Fluxus humoralis, M. 357  
 Fractura, S. 67 L. 236 V. 468 *Sag.* 98 C. 150  
 Framboesia, S. 299 *Sag.* 125 C. 89

Frigeraria, *Sag.* 318  
Frigus, V. 185  
Fungus, V. 423  
Furor uterinus, V. 331  
Furunculus, S. 18 V. 352 *Sag.* 23 C. 7

## G

Galactia, L. 207 V. 122  
Galactirrhoea, S. 270 *Sag.* 205  
Galbulus, V. 559  
Galiancon, V. 558  
Ganglion, L. 288 V. 379 C. 138.  
Gangraena, S. 314 L. 234 V. 327 *Sag.* 140 C. p. 87  
Gastrica, L. 49  
Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56 *Sag.* 306 C. 15  
Gastrocele, S. 52 V. 410 *Sag.* 54  
Gastrodynia, S. 203 *Sag.* 161 C. 45  
Gelasmus, V. 210  
Gibber, L. 301 V. 512  
Gibbositas, S. 30 *Sag.* 70  
Glaucoma, V. 241 C. 92  
Glossiagra, V. 138  
Glossocele, V. 197  
Glossocoma, V. 198  
Glus, L. 200 V. 117 C. 124  
Gonagra, V. 139  
Gongrona, V. 371  
Gonorrhoea, S. 268 L. 201 V. 118 *Sag.* 204 C. 122  
Grando, V. 435

## 398 INDEX GENERUM.

Gravedo, L. 42 V. 126 C. 40  
 Graviditas, S. 284 L. 221 *Sag.* 111  
 Gryposis, V. 537  
 Gutta rosea, S. 4.C. 7  
 ----- rosacea, V. 437 C. 7

### H

Hæmalopia, V. 289 C. 95  
 Haemataporia, *Sag.* 103  
 Haematemefis, S. 242 L. 185 V. 89 *Sag.* 177 C. 39  
 Haematopedefis, V. 95  
 Haematuria, S. 243 L. 199 V. 92 *Sag.* 178 C. 39  
 Haemeropathos, *Sag.* 13  
 Haemodia, V. 146  
 Haemoptoe, V. 83 C. 37  
 Haemoptysis, S. 240 L. 180 V. 84 *Sag.* 175 C. 37  
 Haemorrhagia, S. 239 L. 174 V. 81 *Sag.* 174 M. 356  
     C. 36, 116  
 Haemorrhoidalis, V. 75  
 Haemorrhoids, S. 247 L. 193 *Sag.* 182 C. 38  
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80 *Sag.* 320 C. p. 80  
 Hemalopia, V. 245  
 Hemerolopia, V. 244  
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143 *Sag.* 154  
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 *Sag.* 276 C. 43  
 Hemitritæa, L. 23 C. 1  
 Hepatalgia, S. 205 *Sag.* 163  
 Hepatica, L. 51  
 Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 *Sag.* 181 C. 61  
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 *Sag.* 312 C. 17

- Hepaticon, L. 324  
Hepatocele, S. 53 V. 411  
Herminaphroditus, V. 552  
Hernia, L. 292 C. 142  
Herpes, S. 7 L. 269 V. 443 *Sag.* 11 C. 147  
Hidroa, S. 10 V. 446  
Hieranofos, L. 144 V. 190 M. 363 C. 50  
Hieropyr, V. 344 C. 7  
Himantosis, V. 151  
Hippus, L. 137 V. 199  
Hirfuties, L. 315 V. 524 *Sag.* 77  
Hordeolum, S. 27 L. 277 V. 434 *Sag.* 32 C. 7  
Horror, V. 186  
Humoraria, *Sag.* 317  
Hydarthrus, S. 38 *Sag.* 41 C. 140  
Hydatis, S. 34 *Sag.* 38 C. 139  
Hydrenteroccele, V. 406  
Hydroa, *Sag.* 15  
Hydrocele, V. 388 C. 81  
Hydrocephalum, V. 384 C. 76  
Hydrocephalus, S. 285 L. 217 V. 384 *Sag.* 112 C. 76  
Hydrociftis, V. 315  
Hydrometra, S. 289 *Sag.* 116 C. 80  
Hydromphalos, V. 387  
Hydropedesis, V. 121 C. 118  
Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 *Sag.* 343 M. 363  
C. 64  
Hydrophthalmia, V. 385  
Hydrops, M. 367  
Hydrops scroti, V. 389 C. 81  
Hydrorachitis, S. 287 *Sag.* 114 C. 77

- Hydrothorax, S. 150 V. 311 *Sag.* 256 M. 365 C. 78  
 Hygrofirfocele, V. 414  
 Hypercatharsis, V. 123  
 Hyperartetiscus, V. 557  
 Hyperostosis, V. 418 C. 141  
 Hypnobatasis, V. 340 C. 68  
 Hypochondriasis, S. 220 L. 76 V. 218 *Sag.* 332  
     C. 46  
 Hypogastrocele, V. 403  
 Hypophasis, V. 234  
 Hypopyon, V. 356  
 Hypofarca, L. 219 C. 82  
 Hypopydiaeos, V. 547  
 Hypostaphyle, S. 44 *Sag.* 47  
 Hyfteralgia, S. 206 L. 55 V. 169 *Sag.* 166  
 Hyfteria, S. 135 L. 126 V. 219 *Sag.* 242 C. 63  
 Hyfteritis, L. 58 V. 67 C. 21  
 Hyfterocele, S. 55 V. 413  
 Hyfterolexia, S. 58 *Sag.* 65  
 Hyfterophyse, V. 317 C. 74  
 Hyfteroptosis, S. 49 V. 393 *Sag.* 52

## I

- Ictericodes, V. 32  
 Icterus, L. 225 V. 306 M. 367 C. 91  
 Ileus, S. 252 V. 162 *Sag.* 187 C. 59  
 Iliaca, L. 186 C. 59  
 Illofis, V. 200

- Impetigo, V. 462  
 Incubus, V. 211 C. 68  
 Inflammatio, L. 232 *Sag.* 20 M. 354 C. 7  
 Intertrigo, L. 248 V. 502 C. 7  
 Ionthos, V. 436  
 Ischias, S. 213 V. 138 *Sag.* 170 C. 22  
 Ischiatocele, V. 401  
 Ischioccele, *Sag.* 60  
 Ischnophonia, V. 260 C. 113  
 Ischnotis, V. 541  
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 *Sag.* 212 M. 361 C.  
     124  
 Judicatoria, *Sag.* 316

## L

- Labarium, L. 310  
 Labium leporinum, V. 522  
 Laceratura, L. 243 C. 145  
 Lactea, V. 76  
 Lagocheilos, V. 552  
 Lagophthalmia, L. 306 V. 516  
 Lagophthalmus, V. 516  
 Lagostoma, L. 311 *Sag.* 72  
 Languor, L. 91  
 Laparoccele, *Sag.* 56  
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222 *Sag.* 147  
 Leiopodes, V. 545  
 Leipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 44  
 Leipyria, V. 24  
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6

## D d d



- Lentigo, L. 325 V. 455  
 Leontiasis, S. 297 *Sag.* 123  
 Lepra, S. 303 L. 263 *Sag.* 129 C. 88  
 ———Arabum, V. 321  
 ———Graecorum, V. 320 C. 88  
 Leptophonia, V. 254 C. 112  
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 *Sag.* 285 C. 42  
 Leuce, V. 460  
 Leucoma, S. 1 *Sag.* 1  
 Leucophlegmatia, L. 215 C. 72  
 Leucorrhoea, S. 267 L. 202 V. 119 *Sag.* 202. C. 39  
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 38, 61  
 Lichen, V. 462  
 Licnteria, S. 256 L. 189 V. 108 *Sag.* 191 C. 61  
 Lipothymia, *Sag.* 279 L. 93  
 Lippitudo, L. 267  
 Lithiasis, V. 165 M. 361  
 Lochiorrhoea, *Sag.* 203  
 Lordosis, S. 31 L. 302 V. 512 *Sag.* 71  
 Loxarthrus, S. 62 *Sag.* 69  
 Lues Venerea, M. 368  
 Lumbago, S. 212 V. 138 *Sag.* 169 C. 22  
 Lupia, S. 37 *Sag.* 40 C. 137  
 Luxatio, V. 472 C. 144  
 Luxatura, L. 237 C. 144  
 Lyngodes, V. 26

## M

- Macropnoca, V. 266  
 Madarosis, V. 530

- Malacia, V. 300 C. 103  
Malacotheon, V. 523  
Mallo, S. 298 *Sag.* 124  
Mania, S. 235 L. 68 V. 331 *Sag.* 349 C. 67  
Marasmus, L. 212 C. 70  
Marisca, S. 35 *Sag.* 37 C. 38  
Marmaryge, V. 290 C. 95  
Mastodynia, S. 210 V. 153 *Sag.* 167 C. 7  
Mediafina, V. 52 C. 11  
Melaena, S. 249 *Sag.* 184  
Melanchlorus, V. 307  
Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 *Sag.* 347 C. 66  
Melaficterus, S. 307 *Sag.* 133  
Melasma, L. 323 V. 451  
Meliceris, V. 420  
Menorrhagia, S. 244 L. 203 V. 96 C. 39  
Menstrua, V. 11  
Merocele, V. 399 *Sag.* 57  
Mesenteritis, V. 60 C. 14  
Meteorismus, S. 292 *Sag.* 119 C. 73  
Metritis, S. 107 *Sag.* 315 C. 21  
Metrorrhagia, *Sag.* 179 C. 39  
Miliaria, C. 32  
Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 *Sag.* 295 C. 32  
Mola, L. 206 V. 566  
Monstrositas, V. 539  
Morbilli, V. 453 C. 28  
Morbillofa, V. 36 C. 30  
Morosis, L. 106 V. 336 C. 65  
Morphoea, L. 320  
Morsura, L. 245

Morfus, *Sag.* 81  
 Morta, L. 1 C. 34  
 Mortificatio, M. 367  
 Mutitas, S. 165 V. 257 *Sag.* 271 C. 111  
 Mydriasis, V. 237 C. 93  
 Myocoilitis, V. 63  
 Myopia, L. 309 C. 94  
 Myopiasis, V. 515 C. 94  
 Myositis, *Sag.* 301 C. 22  
 Myrmaecium, L. 280 V. 426

## N

Naevus, S. 5 L. 319 V. 538 *Sag.* 4  
 Natta, L. 289  
 Nausea, S. 250 L. 183 V. 159 *Sag.* 185 C. 45  
 Nebula, *N.* 464  
 Necrosis, S. 315 *Sag.* 141  
 Nefrendis, V. 555  
 Nephralgia, S. 207 *Sag.* 165  
 Nephritica, L. 56  
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65 *Sag.* 314 C. 19  
 Noma, L. 252 V. 489 C. 146  
 Nonana, V. 8 C. 2  
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 *Sag.* 338 C. 106, 66  
 Nyctalopia, L. 307 V. 243  
 Nymphomania, S. 229 *Sag.* 341 C. 105  
 Nyctagmus, S. 124 *Sag.* 230

## O

- Oblivio, L. 107 V. 338 C. 65  
 Obstipatio, L. 166 V. 128 *Sag.* 221 C. 123  
 Obstipitas, S. 118 *Sag.* 224 C. 115  
 Octana, V. 7 C. 2  
 Odaxismus, V. 147  
 Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 *Sag.* 157 M. 359  
     C. 23  
 Odontirrhoea, V. 86  
 Oedema, S. 12 L. 230 V. 382 *Sag.* 17  
 Oesophagismus, V. 217  
 Omentitis, V. 61 C. 14  
 Omphalocele, V. 398 *Sag.* 55  
 Oneirodynia, C. 68  
 Onychia, V. 346  
 Onyx, V. 355  
 Operatio, *Sag.* 85  
 Ophiafis, V. 529  
 Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 *Sag.* 155 C. 8  
 Ophthalmites, V. 47 C. 8  
 Ophthalmorrhagia, V. 88  
 Opisthotonos, V. 181 C. 48  
 Opodeocele, *Sag.* 59  
 Orgasmus, L. 133  
 Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 *Sag.* 253 M. 365  
     C. 56  
 Ofcedo, S. 140 V. 263 *Sag.* 247  
 Ofcheocele, S. 41 V. 397 C. 81  
 Ofcheophyma, *Sag.* 44 C. 81  
 Ofcitans, V. 31  
 Ofcitatio, L. 151

Osteocopus, V. 176

Osteofarctosis, M. 367

Ostocopus, S. 184 L. 61 *Sag.* 143 M. 359

Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148 *Sag.* 156 M. 359 C. 7

Otitis, V. 48

Otoplastos, V. 102

Otopuosis, V. 101

Otorrhoea, S. 271 L. 172 V. 87 *Sag.* 206

Oxyphonia, V. 255 C. 112

Ozaena, L. 254 V. 500 C. 145

## P

Paedarthrocace, V. 419 C. 7

Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 *Sag.* 237 C. 54

Panarititia, V. 70

Pancreatica, V. 64

Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264 *Sag.* 233

Panophobia, S. 227 L. 75 *Sag.* 339 C. 66

Papula, S. pag. 8 L. 276 *Sag.* 7 C. 7

Paracentesis, *Sag.* 88

Paracusis, S. 159 *Sag.* 265 C. 97

Paracyifis, V. 326

Paraglossa, S. 45 V. 365 *Sag.* 48

Paralysis, S. 169 L. 104 V. 226 *Sag.* 275 M. 364  
C. 43

Paraphymosis, V. 349 C. 7

Paraphonia, S. 168 C. 112

Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 11

Paraphrenitis, V. 55 C. 11

Paraphrosyne, S. 232 L. 66 V. 330 *Sag.* 345 C. 67

Paraplegia, L. 102 V. 227 C. 43

- Paraplexia, S. 171 *Sag.* 277 C. 43  
Paronychia, S. 21 L. 259 V. 345 *Sag.* 26 C. 7  
Parorchidium, S. 59 *Sag.* 66  
Parotis, S. 17 V. 370 *Sag.* 22 C. 133  
Parturitio, L. 204  
Parulis, V. 362 C. 7  
Pavor, V. 339  
Pelada, V. 529  
Pelioma, V. 451  
Pemphigus, S. 93 *Sag.* 291 C. 34  
Pemphingodes, V. 43  
Periadynia, V. 155  
Pericarditis, V. 53 C. 13  
Perinaeoecele, *Sag.* 62  
Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 *Sag.* 311 C. 11  
Peritonitis, V. 62 C. 14  
Peritonoeorixis, *Sag.* 64  
Pernio, L. 259 V. 350 C. 7  
Pertussis, C. 57  
Pestilentialis, V. 33 C. 27  
Pestis, S. 91 L. 2 *Sag.* 289 C. 30  
Petechia, L. 5 V. 452 C. 35  
Petechialis, V. 38  
Phagedaena, V. 488 C. 146  
Phalacrotois, V. 528  
Phalangosis, V. 533  
Phantasma, L. 73 V. 287 C. 95  
Phimosis, S. 22 L. 298 V. 348 *Sag.* 27 C. 7  
Phlegmatia, S. 282 *Sag.* 109 C. 75  
Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 *Sag.* 299 C. 7  
Phlogosis, V. 220 C. 7

- Phlyctæna, S. pag. 9 L. 274 V. 442 *Sag.* 8 C. 139  
 Phlyxacion, V. 450  
 Phoenigmus, S. 308 *Sag.* 134  
 Phoxos, V. 511  
 Phrenismus, V. 45 C. 9  
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 *Sag.* 303 C. 9, 6  
 Phricafinus, *Sag.* 239  
 Phricodes, V. 25  
 Phthiriasis, S. 310 V. 324 *Sag.* 136  
 Phthifis, S. 276 L. 209 V. 310 *Sag.* 101 C. p. 158  
 Phygethlon, V. 357  
 Phyma, V. 359  
 Physconia, S. 283 V. 325 *Sag.* 110 M. 367 C. 82  
 Phyfocele, V. 416  
 Phyfocephalus, S. 286 *Sag.* 113  
 Physometra, S. 290 *Sag.* 117 C. 74  
 Pica, S. 222 V. 301 *Sag.* 334 C. 103  
 Pinnula, V. 432  
 Piptonychia, V. 484  
 Pituitaria, V. 111 C. 61  
 Pityriasis, V. 476  
 Pladarotis, V. 431  
 Plancus, V. 545  
 Plautus, V. 545  
 Plethora, L. 226 *Sag.* 105  
 Pleuritica, L. 53  
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 *Sag.* 305 C. 11  
 Pleurodyne, S. 148 V. 138 *Sag.* 254 M. 360 C. 22  
 Plica, L. 314 V. 323 C. 90  
 Plicatio, V. 470

- Pneumatosis, S. 280 V. 391, 156 *Sag.* 107 C. 72  
 Pneumonia, C. 11  
 Pneumonica, L. 54  
 Pnigma, V. 270  
 Podagra, V. 175 C. 24  
 Podagrica, V. 69 C. 24  
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295 *Sag.* 336 C. 102  
 Polymerisma, *Sag.* 74  
 Polypus, V. 377 C. 134  
 Polyfarcia, S. 279 L. 214 V. 540 *Sag.* 106 M. 367  
     C. 71  
 Porrigo, V. 476  
 Porrus, V. 427 C. 134  
 Presbytia, L. 308 C. 94  
 Pressura, L. 261  
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173 *Sag.* 227  
 Proctalgia, S. 214 *Sag.* 171 M. 362 C. 7  
 Proctica, L. 59 V. 167  
 Proctitis, L. 30 C. 7  
 Proctorrhoea, *Sag.* 193  
 Profusio, L. 240 C. 117  
 Prolapsus, L. 293 C. 143  
 Proptoma, S. 46. *Sag.* 49.  
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136 *Sag.* 149  
 Psellismus, S. 167 L. 138 *Sag.* 273 C. 113  
 Psellotis, V. 259 C. 113  
 Pseudoblepsis, C. 95  
 Psophos, V. 177  
 Pfora, L. 266 V. 320 C. 149  
 Pforiasis, V. 174  
 Psyracia, S. 9 V. 442 *Sag.* 14



Pterygium, S. 26 L. 296 V. 433 *Sag.* 31  
 Ptilosis, V. 531  
 Ptofis, V. 235  
 Ptyalifinus, S. 261 L. 177 V. 103 *Sag.* 197 C. 120  
 Pudendagra, S. 215 L. 58 V. 168 *Sag.* 172  
 Punctura, S. 64 L. 244 *Sag.* 79 C. 145  
 Puorrhoea, V. 106  
 Puoturia, V. 116  
 Purpura, S. 96 V. 449 *Sag.* 292 C. 35  
 ——— scorbatica, V. 443  
 Pustula, S. pag. 8 L. 275 *Sag.* 6 C. 7  
 Pyrosis, S. 200 *Sag.* 158 C. 58  
 Pyuria, S. 266 *Sag.* 201

## Q

Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 *Sag.* 326 C. 1  
 ——— duplex, V. 13  
 ——— triplex, V. 14  
 Quintana, V. 4 C. 2  
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 *Sag.* 324 C. 3  
 ——— continua, V. 15

## R

Rabies, L. 85 *Sag.* 344  
 Rachialgia, S. 211 *Sag.* 168 C. 59  
 Rachitis, S. 294 L. 213 V. 312 *Sag.* 120 C. 83  
 Rachosis, V. 503  
 Ranula, V. 380  
 Raphania, L. 135 V. 192 C. 52

- Raucedo, L. 146 C. 40, 112  
 Raucitas, V. 252 C. 40, 112  
 Renchus, V. 271  
 Rhagas, L. 249 S. 75 V. 467 *Sag.* 96  
 Rhenophonia, V. 256 C. 112  
 Rheuma, S. 149 *Sag.* 255 C. 40  
 Rheumatica, V. 74  
 Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 *Sag.* 144 M. 358  
     C. 22  
 Rhicnosis, V. 542  
 Rochmos, V. 272  
 Rhoeas, V. 520  
 Rhopalosis, V. 323 C. 90  
 Rhyffemata, V. 521  
 Rigo, S. 132 L. 141 V. 187  
 Rifus, L. 148  
 — fardonicus, V. 210  
 Rodatio, V. 532  
 Ronchus, V. 272  
 Rubeola, S. 94 L. 4 *Sag.* 293 C. 28  
 Ruetus, L. 182 V. 215  
 Ruminatio, V. 216  
 Ruptura, S. 69 L. 238 V. 466 *Sag.* 84

## S

- Saniodes, V. 550  
 Sarcocelc, V. 415  
 Sarcoma, S. 23 L. 295 V. 376 *Sag.* 28 C. 134  
 Sarcoftosis, M. 367  
 Sardiasis, L. 125 V. 209  
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 *Sag.* 340 C. 104, 105

- Scabies, S. 304 V. 444 *Sag.* 130 C. 149  
 Scarlatae, V. 454  
 Scarlatina, S. 98 V. 39 *Sag.* 294 C. 29  
 Scelotyrbe, S. 136 V. 195 *Sag.* 243 C. 51  
 Schirrus, S. 14 L. 284 V. 374 *Sag.* 19 C. 131  
 Sclopetoplaga, *Sag.* 80  
 Scoliosis, V. 512  
 Scorbutus, S. 301 L. 224 V. 318 *Sag.* 127 M. 368  
     C. 86  
 Scotomia, L. 111  
 Screatus, L. 178  
 Scrophula, S. 295 V. 367 *Sag.* 121 M. 368 C. 84  
 Seifis, V. 512  
 Seline, V. 463  
 Septana, V. 6 C. 2  
 Serpigo, L. 268 V. 443  
 Sextana, V. 5 C. 2  
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212 *Sag.* 248  
 Sinus, S. 73 V. 492 *Sag.* 92 C. 146  
 Siriasis, V. 34 C. 9  
 Soda, L. 47 V. 154 C. 45, 58  
 Somnambulismus, S. 221 L. 77 *Sag.* 333 C. 68  
 Somnium, V. 339 C. 68  
 Somnolentia, L. 96 V. 233  
 Spanopogon, V. 556  
 Sparganosis, V. 372  
 Spasma, V. 479  
 Spasmus, L. 121  
     —— oesophagi, V. 217  
     —— cynicus, V. 209  
     —— maxillae inferioris, V. 208  
 Sphacelismus, L. 32 C. 9

- Sphacelus, L. 235 V. 328 C. p. 87  
Spina bifida, V. 386 C. 77  
Spinola, L. 290 C. 77  
Splenalgia, S. 206 *Sag.* 164  
Splenica, L. 52  
Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 *Sag.* 313 C. 18  
Splenocoele, S. 54 V. 412  
Staphyloma, S. 36 V. 421 *Sag.* 39  
Staphylofisis, V. 422  
Steatites, V. 390 C. 71  
Steatoma, V. 420  
Sterilitas, L. p. 104 *Sag.* 211 C. 125  
Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204 *Sag.* 246  
Stertor, S. 143 L. 156 V. 271 *Sag.* 250  
Stigma, V. 457  
Stomacace, S. 241 L. 176 V. 85 *Sag.* 176 C. 39  
Strabismus, S. 116 L. 305 V. 514 *Sag.* 222 C. 114  
Stranguria, L. 197 V. 163  
Stridor, L. 136  
Struma, L. 285 C. 84  
Stupiditas, V. 336 C. 65  
Stupor, S. 189 L. 105 *Sag.* 148  
Stymatosis, V. 94  
Subluxatio, V. 473  
Subfultus, L. 134 *Sag.* 232  
Sudamen, L. 322  
Sudamina, V. 446  
Sudor, L. 208 C. 118  
Suffocatio, L. 158  
—— hystérica, V. 196  
Suffusio, S. 217 *Sag.* 329 C. 95

Sugillatio, L. 231 C. 130  
 Suppuratoria, V. 78  
 Surditas, V. 247 C. 96  
 Suspirium, L. 150 V. 262  
 Sufurrus, V. 292  
 Sutura, *Sag.* 87  
 Sycofis, V. 490 C. 145  
 Syncopalis, V. 29  
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 *Sag.* 280 C. 44  
 Synizefis, V. 240 C. 92  
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4  
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 4 et 6  
 Syphilis, S. 300 L. 6. V. 319 *Sag.* 126 C. 85  
 Syrigmos, S. 219 *Sag.* 331 C. 97  
 Syringmos, L. 72

## T

Tabes, S. 275 L. 210 V. 309 *Sag.* 100 C. 69  
 Talpa, V. 420  
 Tarantifmus, S. 230 L. 84 V. 193 *Sag.* 342  
 Tenefmus, S. 257 L. 194 V. 166 *Sag.* 192  
 Terminthus, V. 381 C. 7  
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 *Sag.* 325 C. 1  
 ——— duplex, V. 12  
 Testudo, V. 420  
 Tetanus, S. 122 L. 127 V. 180 *Sag.* 228 M. 362  
 C. 48  
 Tetartophya, S. 86 L. 22 *Sag.* 323 C. 2  
 Therioma, V. 486 C. 145  
 Thlasis, V. 471  
 Tinea, S. 305 L. 264 V. 497 *Sag.* 131 C. 147

- Tofus, V. 424  
 Torpor, V. 224  
 Tortura, L. 304  
 Trachelophyma, *Sag.* 33  
 Traulotis, V. 258 C. 113  
 Tremor, S. 129 L. 131 V. 184 *Sag.* 236 C. p. 196  
 Trichinasis, L. 317 V. 517  
 Trichoma, S. 311 *Sag.* 137 C. 90  
 Trifmus, S. 117 L. 124 V. 207 *Sag.* 223 M. 363 C. 48  
 Tritaeophya, S. 85 *Sag.* 322 C. 1  
 Tritaeus, L. 21 C. 1  
 Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 *Sag.* 249 C. 40  
 Tylloma, V. 429 C. 136  
 Tympanites, S. 291 L. 220 V. 316 *Sag.* 118 M. 367  
     C. 73  
 Typhomania, S. 178 L. 97 V. 23 *Sag.* 284 C. 42  
 Typhus, S. 82 *Sag.* 319 C. 5

## V

- Vaga, V. 10 C. 2  
 Valgus, V. 544  
 Varicella, V. 42, 448 C. 27  
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447 *Sag.* 290 C. 26  
 Variolosa, V. 35 C. 26  
 Varix, S. 33 L. 283 V. 407. *Sag.* 36 C. 129  
 Varus, S. p. 9 L. 270 V. 436 et 543 *Sag.* 10 C. 7  
 Verruca, S. 25 L. 278 V. 426 *Sag.* 30 C. 135  
 Vertigo, S. 210 L. 74 V. 293 *Sag.* 328  
 Vefania, L. 70 C. 66  
 Vibex, L. 321 V. 458  
 Vitiligo, S. 2 V. 459 *Sag.* 2

- Ulcus, S. 71 L. 250 C. 146 *Sag.* 89  
Vociferatio, L. 147  
Volatica, L. 63 V. 178 C. 22  
Vomica, L. 181 V. 104 C. p. 106  
Vomitus, S. 251 L. 184 V. 214 *Sag.* 186 C. 45  
Uredo, L. 8. C. 33  
Urorrhoeas, V. 548  
Urticaria, V. 361, 456 C. 33  
Urticata, V. 40 C. 33  
Vulneraria, V. 77  
Vulnus, S. 63 L. 241 V. 465 *Sag.* 78 C. 145

## X

- Xirafia, V. 527

## Z

- Zoster, V. 344

## C A T A L O G U S

Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis non oportebat. *Vide Prolegomina, pag. xxi.*

Aglaētatio, L.

Agalaxis, V.

Alopecia

Anchylops

Ægilops

Anchylofis, L.

Anchylofis, V.

Angina, S. et L.

Angina pectoris

Antipathia

Beriberia

Cardiogmus

Cephalaea

Cephalalgia

Distortio

Aglutitio

Acatapofis

Oefophagismus

Dystocia

Parturitio et alii gravidarum et parturientium morbi

Elcofis

Eflera

Hemicrania



Leucorrhoea ex vitio locali

Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis  
partibus

Malis

Coccyta, L.

Melaena

Melanchterus

Melanchlorus, V.

Myocoilites

Necrosis

Odaxismus

Dentitio et alii infantum morbi

Paralysis partis singularis ex vitio musculorum

Physocephalus

Pnigma

Catarrhus suffocativus *Auct.*

Pyuria

Puoturia

Sterilitas utriusque sexus

Acyasis, V.

Stymatosis

Tarantismus

Venena

Vermes

# I N D E X.

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis non inveniuntur.

*Numeri indicant paginam.*

- Amaurosis a myosi, 304.
- Amaurosis a synchysi, 304.
- Amblyopia hydrophthalmica, 305.
- Amphimerina anginosa, 97.
- Amphimerina biliosa, 56.
- Amphimerina cardiaca, 53.
- Amphimerina catarrhalis, 173.
- Amphimerina epiala, 54.
- Amphimerina hemitritaeus, 49.
- Amphimerina humorosa, 54.
- Amphimerina hungarica, 55.
- Amphimerina paludosa, 56.
- Amphimerina peripneumonica, 102.
- Amphimerina phricodes, 54.
- Amphimerina pseudohemitritaeus, 49.
- Amphimerina semiquartana, 61.
- Amphimerina semiquintana, 53.
- Amphimerina spasmodica, 62.
- Amphimerina syncopalis, 54.
- Amphimerina tussiculosa, 174. et 232.
- Angina spasmodica, 215.
- Aphonia paralytica, 194.

- Arthritis rheumatica, 128.  
Ascites flatulento-peritoneus, 274.  
Ascites sanguineo uterinus, 283.  
Ascites uterinus, 283.  
Asphyxia a carbone, 188.  
Asphyxia congelatorum, 189.  
Asphyxia flatulenta, 190.  
Asphyxia foricariorum, 188.  
Asphyxia a fumis, 188.  
Asphyxia hysterica, 192.  
Asphyxia immerforum, 190.  
Asphyxia a mephitide, 188.  
Asphyxia a musto, 188.  
Asphyxia a pathemate, 189.  
Asphyxia sideratorum, 189.  
Asphyxia spinalis, 185.  
Asphyxia suspenforum, 190.  
Asthma a hydrocephalo, 187.  
Asthma catarrhale, 228.  
Asthma febricosum, 231.  
Asthma a gibbo, 229.  
Asthma metallicum, 230.  
Asthma pneumodes, 228.  
Asthma a polypo cordis, 230.  
Asthma pulverulentorum, 230.  
Atrophia febrilequa, 268.  
Atrophia infantilis, 268.  
Atrophia rachitica, 268.

C

- Cardialgia inflammatoria, 111.
- Cardialgia sputatoria, 233.
- Catarrhus Bellinfulanus, 97.
- Cephalaea febricosa, 64.
- Cephalalgia catarrhalis, 174.
- Cephalalgia inflammatoria, 91.
- Cephalalgia intermittens, 64.
- Cholera ficca auriginosa, 237.
- Convulsio Indica, 212.
- Convulsio a nervi punctura, 215.
- Convulsio raphania, 218.
- Convulsio ab uftilagine, 219.

D

- Diarrhoea carnofa, 180.
- Dysenteria a catharticis, 181.
- Dysenteria a mefenterii vomica, 244.
- Dysenteria Parifiaca, 181.

E

- Eclampsia febricosa, 50.
- Eclampsia typhodes, 217.
- Enteritis mefenterica, 110.
- Ephemera Britannica, 77.

Ephemera dichomene, 63.  
Ephemera fudatoria, 77.  
Epilepsia febricosa, 50.  
Erysipelas ambustio, 85.  
Erysipelas symptomaticum, 86.  
Erysipelas a vespis, 86.

## H

Hepatalgia apostematosa, 116.  
Herpes Zoster, 143.  
Hydrometra ovarii, 281.  
Hysteralgia febricosa, 64.  
Hysteria febricosa, 50.

## I

Ischias ex abscessu, 129.  
Ischias intermittens, 64.

## L

Lumbago apostematosa, 129.  
Lumbago ab arthrocace, 129.  
Lumbago psoadica, 129.

## M

Menorrhagia difficilis, 360.

Miliaris nautica, 74.  
Miliaris purpurata, 74.  
Miliaris sudatoria, 78.  
Mutitas a glossolyfi, 194.

## N

Nephralgia arenosa, 117.  
Nephralgia arthritica, 117.  
Nephralgia calculosa, 117.  
Nephralgia febricosa, 64.  
Nephralgia purulenta, 117.  
Nephralgia rheumatica, 119.

## O

Ophthalmia febricosa, 64.  
Orthopnoea hysterica, 226.  
Orthopnoea spasmodica, 226.

## P

Phrenitis apyreta, 263.  
Phrenitis inanitorum, 262.  
Pleuritis hepatica, 115.  
Pleuritis periodica, 51.  
Pleuritis splenica, 116.  
Pleurodyne parapleuritis, 104.  
Pleurodyne verminosa, 106.

Pleurodyne vomica, 106.

Pfydracia a vespis, 86.

Pyuria arthritica, 357.

Pyuria mucosa, 357.

Pyuria viscida, 357.

Q

Quotidiana deceptiva, 53.

Quotidiana epileptica, 50.

Quotidiana soporosa, 49.

S

Scarlatina anginosa, 138.

Scelotyrbe festinans, 216.

Scelotyrbe verminosa, 216.

Scrophula mesenterica, 267.

Splenalgia suppuratoria, 116.

Synocha catarrhalis, 174.

Synocha miliaris, 79.

Synochus dysenteriodes, 80.

Synochus hiemalis, 70.

Synochus pleuritica, 70. et. 105.

Synochus rheumatizans, 70.

Synochus scorbutica, 71.

T

- Tabes dorsalis, 269.
- Tabes a hydrope, 270.
- Tabes nutricum, 269.
- Tabes a sanguifluxu, 269.
- Tabes sudatoria, 269.
- Tabes syphilitica, 270.
- Tetanus febricosus, 50.

V

- Variola lymphatica, 134.

F I N I S.